3 362130 187684 >

CORTEVA agriscience

Questar™

Inatreq™ active

FUNGICIDE

GROUP 21 FUNGICIDE

FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN GRANEN

Aard van het preparaat: EC - Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof : fenpicoxamid (inatreq)
Gehalte: 50 g/L
Professioneel gebruik
Toelatingsnummer: 16180N (W1)

Toelatingshouder:
Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D
4611 BB Bergen op Zoom
Nederland
Website: www.corteva.nl

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330 of** het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

Lotnummer : zie op de fles

STORL VERPAKKING Bedrijfsafval

Copy

2305 280638

™,® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

5 L e

CORTEVA™ agriscience

Questar™

Inatreq™ active

FUNGICIDE

UFI: U059-V0Q8-400N-VTFP

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 2-ethylhexanol, Alcoholen, C11-14-iso-, C13-rijk, geëthoxyleerd benzeensulfonzuur, 4-C10-14-alkyl derivaten, calciumzouten; reactiemengsel van N,N-dimethyldecaan-1-amide en N,N-dimethyloctaanamide

GEVAAR



GHS05 GHS07 GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming / gehoorbescherming / ...
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk, blijven spoelen.
P314	Bij onwel voelen, een arts raadplegen.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

COPY

A60008186

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Bruine roest[1] Gele roest[2]	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte[3]	1,5 L/ha	
Winterrogge	Bruine roest[4]	2,0 L/ha	1
Triticale	Gele roest[2]	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte[3]	1,5 L/ha	
Spelt	Bruine roest[1] Gele roest[2]	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte[3]	1,5 L/ha	
Zomertarwe	Bruine roest[1] Gele roest[2]	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte[3]	1,5 L/ha	
Zomerrogge	Bruine roest[4]	2,0 L/ha	1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

[1] Bruine roest (*Puccinia triticina)*

[2] Gele roest (*Puccinia striiformis)*

[3] Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici/Septoria* spp.)

[4] Bruine roest (*Puccinia recondita*)

COPY

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreq). Fenpicoxamide hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

WERKINGSSPECTRUM

Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici/ Septoria* spp.)
Bruine roest (*Puccinia triticina/ Puccinia recondita)*
Gele roest (*Puccinia striiformis)*

GEBRUIKSAANWIJZING

Questar™ moet preventief worden ingezet. Het middel toepassen in combinatie met een fungicide met een ander werkingsmechanisme, eveneens werkzaam tegen bladvlekkenziekte en roesten. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten



Einde behandeling <= 30 minuten =>



regen

COPY

2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van Questar™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral nauwkeurig worden berekend.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Copy

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Copy