## Fiche d'identité

| | |
|---|---|
| **AMM** | N° 2220690 |
| **Composition et mode d'action** | |
| **Arylex™ active** 10 g/L + Piclorame 48 g/L + Aminopyralide 32 g/L (3 molécules HRAC 4 mimétiques de l'auxine) | |
| **Formulation** | (EC) Émulsion concentrée |
| **Classement** | H315 – 318 – 335 – 400 – 410 |
| **ZNT** | 5 m |
| **DSR**[1] | 3 m |
| **DRE**[2] | 24 h après traitement |
| **Mode d'absorption** | Foliaire et racinaire |

[1] DSR = Distance de Sécurité Riverain
[2] DRE = Délai de Réentrée

## Utilisations

| | |
|---|---|
| **Culture** | **Colza d'hiver** |
| **Dose** | 0,25 L/ha |
| **Stades d'application** | À partir de 3F jusqu'au stade rosette du colza |
| **Précisions réglementaires** | - 1 an sur 2 pour tout produit à base de Piclorame<br>- 1 an sur 3 pour tout produit à base d'Aminopyralide |

**LaDiva™ :** Danger. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H315 - Provoque une irritation cutanée. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur. P260 - Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/ une protection auditive/... P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

**Kerb™ Flo :** Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H351 - Susceptible de provoquer le cancer. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH208 - Contient 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer avec du formaldehyde et du methylphenol, sel de sodium ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P391 - Recueillir le produit répandu.

**LaDiva™ :** EC - concentré émulsionnable, contenant 10 Grammes par litre de Halauxifène-méthyl, 32 Grammes par litre de Aminopyralide, 48 Grammes par litre de Piclorame (acide). AMM N° 2220690 - Corteva Agriscience France S.A.S. Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° Vert 0 800 470 810. ®TM Marques déposées. © 2023, Corteva.
**Kerb™ Flo :** SC - suspension concentrée (concentré fluidifiable), contenant 400 Grammes par litre de Propyzamide. AMM N° 8400574 - Corteva Agriscience France S.A.S. Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° Vert 0 800 470 810. ®TM Marques déposées. © 2023 Corteva.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.

**À VOTRE ÉCOUTE**
0 800 470 810
corteva.fr

Mai 2023

CORTEVA™ agriscience

Visitez www.corteva.fr
TM ® Marques déposées © 2023 Corteva

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

LaDiva™

HERBICIDE

# Désherbez votre colza avec plus de liberté



CORTEVA™ agriscience

Visitez www.corteva.fr
TM ® Marques déposées © 2023 Corteva

## Gérer vos dicotylédones en post-levée avec LaDiva™

**Un contrôle de haut niveau :**

- Absorption foliaire et racinaire pour une efficacité renforcée sur les composées (Matricaires, Séneçon des champs, Chardon Marie, Bleuet)
- Systémie ascendante et descendante pour une meilleure efficacité dans la plante

**Utilisation sur toutes les variétés de colza d'hiver :**

- Positionnement optimal à partir du stade 3-4 feuilles du colza à 0,25 L/ha sur des adventices levées

**Des programmes axés sur la post-levée :**

- Programmes tout en post
- Peut s'associer avec un antigraminée foliaire ou un insecticide*
- Pour les situations à forte pression graminées : en programme avec une base, ciblée sur la gestion des graminées, en pré-semis incorporé ou en pré-levée

** Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations. Nous consulter.*

## Bénéfices de LaDiva™

- **Investir sur un colza bien implanté**
- **Raisonner le désherbage en fonction des adventices levées**
- **Opter pour une solution à large spectre** (géraniums, coquelicot, gaillet, bleuet, chardon-marie, matricaires)
- **Libérer du temps durant la période de semis**
- **Gagner en flexibilité :** applicable dès 5°C et quel que soit l'état du sol
- **Améliorer la rentabilité**



TOUT EN POST

| | |
|---|---|
| **LaDiva™** 0,25 L/ha | **Kerb™ Flo** 1,875 L/ha |

**Solution ciblée sur la gestion des graminées**

| | |
|---|---|
| **LaDiva™** 0,25 L/ha | **Kerb™ Flo** 1,875 L/ha |

| | LaDiva™ 0,25 L/ha suivi de Kerb™ Flo 1,875 L/ha |
|---|---|
| **DICOTYLÉDONES** | |
| Ammi majus | TS |
| Bleuet | TS |
| Capselle | MS |
| Chardon-marie | TS |
| Coquelicot | TS |
| Erodium | MS* |
| Fumeterre | TS |
| Gaillet | S |
| Géranium disséqué | TS* |
| Géranium feuilles rondes | TS* |
| Géranium tige grêle | S* |
| Helminthie | TS |
| Laiterons | TS |
| Légumineuses | TS |
| Lychnis de semis | S |
| Matricaires | TS |
| Mercuriales | S |
| Pensée | S |
| Ravenelle | PS |
| Sanve | PS |
| Séneçon des champs | S* |
| Véroniques | MS |
| **GRAMINÉES** | |
| Brôme | TS |
| Pâturin | TS |
| Ray-grass | TS |
| Vulpin | TS |

TS Très sensible ≥95%
S Sensible 85-94%
MS Moyennement sensible 70-84%
PS Peu sensible 50-69%
TPS Très peu sensible ≤49%

* En l'absence de levées échelonnées et sur stade jeune

COLZÁ changeons nos pratiques

**Pour un désherbage différent plus efficace, plus raisonné et plus rentable**


TM ® Marques déposées © 2023 Corteva