



Benevia®

INSEKTIZID

Neue Packungsgröße: 5l

- ! Spezieller Wirkmechanismus
- » Schneller und effektiver Schutz
- 🐛 Kontrolliert beißende und saugende Schädlinge
- ☁ Sehr gute Regenfestigkeit
- 🌡 Temperatur- und witterungsunabhängig

Wirkstoff	100 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprol)
Formulierung	Dispersion in Öl (OD)
Wirkstoffgruppe	Diamide, IRAC: 28
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Lokalsystemisch und translaminar
Kulturen	Freiland und Gewächshaus: Gemüsekulturen und Erdbeeren (Details Tabelle S. 7)
Bienen/Nützlinge	B1 / NN3001, NN1002
Gebindegröße	1l, 5l

Benevia® – Die Ernte im Blick




Weißer Fliege an Kohl
(*Aleyrodes proetella*)



Larve der Kleinen Kohlfliege
(*Delia radicum*)



Zwiebelthrips
(*Thrips tabaci*)



Spargelfliege
(*Plioreoepta poeciloptera*)




Blattläuse an Erdbeeren
(*Aphidoidea*)



Möhrenfliege
(*Psila rosae*)

Benevia® – Verteilung in der Pflanze



Methode: Isotopenmarkierung

Schutz bis in die Spitzen

Wenn Benevia® auf den Stängel oder die Blattstiele gespritzt wird, bewegt es sich translaminar ins Gewebe und dann aufwärts und nach außen zu angrenzenden Blättern und verbessert so die Verteilung in der Pflanze und die Erreichbarkeit für Schädlinge.



GUT ZU WISSEN



Die Formulierung als ölige Dispersion ermöglicht die translaminare und lokalsystemische Verteilung in den Blättern.

Kultur / Verwendungs-zweck	Schadorganismus	Stadium der Kultur	Max. Zahl der Behand. in der Anw. bzw. je Jahr	Aufwand-menge	Anwendungs-technik	Wartezeit
Freiland						
Blumenkohle (Blumenkohl, Brokkoli), Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl)	Freifressende Schmetterlings-raupen (ausgenommen: Zuckerrübeneule (<i>Spodoptera exigua</i>), Weiße Fliege, Kleine Kohlfliege)	BBCH 11–49	2	0,75 l/ha	spritzen	7 Tage
Erdbeere	Erdbeerblütenstecher	BBCH 12–89	2	0,75 l/ha	spritzen	7 Tage
Möhre, Pastinak	Möhrenfliege	BBCH 11–89	2	0,75 l/ha	spritzen	14 Tage
Zwiebelgemüse	Zwiebelthrips, Zwiebelfliege	BBCH 12–79	2	0,75 l/ha	Spritzen	14 Tage
Spargel (Jung- und Ertragsanlagen)	Spargelfliege	BBCH 09–55: Sprosse durch Bodenoberfläche bis Knospen	1	0,75 l/ha	Spritzen/als Bandbehandlung	F
Kartoffel	Kartoffelkäfer	BBCH 12–69	2	0,125 l/ha	spritzen	14 Tage
Gewächshaus						
Tomate, Aubergine	Tomatenminiermotte (<i>Tuta absoluta</i>), Minierfliegen	BBCH 12–89	4	0,6 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Tomate, Aubergine	Freifressende Schmetterlings-raupen, Weiße Fliegen, Gewächshausmottenschildlaus, Gurkenblattlaus (<i>Aphis gossypii</i>), Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips	BBCH 12–89	4	1,125 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Gurke, Zucchini	Minierfliegen	BBCH 12–89	4	0,6 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Gurke, Zucchini	Freifressende Schmetterlings-raupen, <i>Thrips</i> spp., Gurkenblattlaus (<i>Aphis gossypii</i>), Weiße Fliegen, Gewächshausmottenschildlaus	BBCH 12–89	4	1,125 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Melone, Wassermelone, Flaschenkürbis, Garten-Kürbis	Minierfliegen	BBCH 12–89	4	0,4 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Melone, Wassermelone, Flaschenkürbis, Garten-Kürbis	Freifressende Schmetterlings-raupen, <i>Thrips</i> spp., Gurkenblattlaus (<i>Aphis gossypii</i>), Weiße Fliegen, Gewächshausmottenschildlaus	BBCH 12–89	4	0,75 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Salat-Arten	Freifressende Schmetterlings-raupen	BBCH 12–49	2	0,75 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag
Erdbeeren	Freifressende Schmetterlings-raupen, <i>Thrips</i> spp., Blattläuse, Erdbeerblütenstecher, Zweiflügler (Diptera)	BBCH 12–89	2	0,75 l/ha	spritzen oder sprühen	1 Tag