



EPHON[®] TOP

Régulateur de croissance

Pour réduire la verse en froment d'hiver, froment de printemps, orge d'hiver, orge de printemps, seigle d'hiver, triticale d'hiver, épeautre d'hiver, épeautre de printemps et Lin à fibre de printemps.

Groeiregulator

Ter voorkoming van legeren in winter- en zomergerst, winter- en zomertarwe, winter- en zomer-spelt, wintertriticale, winterrogge en zomervezelvlas.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 660 g/L ethefon
Concitré soluble à base de 660 g/L d'éthéphon.
Toelatingsnummer België / Numéro d'autorization Belgique: 10941P/B
Numéro d'agrément Luxembourg: L02289-123

N° de lot: zie verpakking / voir emballage

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK /
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Waarschuwingssinnen	Mentions de danger
H312 Schadelijk bij contact met de huid.	Nocif par contact cutané.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P260 Sproei niet inademen.	Ne pas respirer les brumes de pulvérisation.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P284 Adembescherming dragen.	Porter un équipement de protection respiratoire.
P301+P330+P331+P310 NA INSLIKKEN: De mond spoelen; GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.	EN CAS D'INHALATION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P302+P361+P352+P310 BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés, laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
Andere etiketelementen	Autres mentions
EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen.	Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gevaar/Danger



UFI: WCJD-M236-CHAW-7V3D

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: +31 10 303 77 25
www.nufarm.com/be



*: Geregistreerd handelsmerk van /
Marque enregistrée de Nufarm



5L^e

510009173_102024



Ephon Top®

Eigenschappen en Werkingswijze.

Ephon Top® bevat ethefon, een systemisch groeihormoon. Ethefon verplaatst zich naar de actieve groeiweefsels, waar het omgezet wordt tot ethyleen. Hierdoor worden de auxines, die verantwoordelijk zijn voor de celstrekking, geremd.

Bij graangewassen reduceert ethefon de strolengte waardoor ze minder snel legeren en het oogsten gemakkelijker wordt. Het beste resultaat wordt verkregen bij graangewassen die in goede groei zijn en de nodige meststoffen en fungiciden gekregen hebben.

Voor de beste werking bij gewassen die sterk gevoelig zijn aan legering is een behandeling met een goedgekeurd middel op basis van chloormequat gevolgd door een behandeling met Ephon Top® aangewezen.

Toepassingen en Doseringen.

Ter voorkoming van legeren (lodging) door reductie van stengelgroei bij:

Wintergerst

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 37–39).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,73–0,91 l/ha, 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomergerst

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH 37–39).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,44–0,58 l/ha, 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Wintertarwe

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 37–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,36–0,91 l/ha, 1 toepassing op wintertarwe die voordien niet behandeld werd met chloormequat.

In de percelen tarwe voorafgaandelijk behandeld met chloormequat waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling aan een dosis van 0,36–0,55 l/ha overwogen worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomertarwe

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 37–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,36–0,91 l/ha, 1 toepassing op zomertarwe die voordien niet behandeld werd met chloormequat.

In de percelen tarwe voorafgaandelijk behandeld met chloormequat waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling aan een dosis van 0,36–0,55 l/ha overwogen worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Winterrogge

Toepassingsstadium: vlagblad volledig uitgegroeid, ligula zichtbaar – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 39–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 1,1 l/ha, 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Wintertriticale

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 37–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,36–0,91 l/ha, 1 toepassing op wintertriticale die voordien niet behandeld werd met chloormequat.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Winterspelt

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 37–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,55 l/ha, 1 toepassing op winterspelt die voordien niet behandeld werd met chloormequat.

In de percelen spelt voorafgaandelijk behandeld met chloormequat waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling aan een dosis van 0,36 l/ha overwogen worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomerspelt

Toepassingsstadium: vlagblad net zichtbaar, nog opgerold – einde opzwelling: vlagbladschede van laatste blad maximaal gezwollen (BBCH 37–45).

Aantal toepassingen: 1.

Dosis: 0,55 l/ha, 1 toepassing op zomerspelt die voordien niet behandeld werd met chloormequat.

In de percelen spelt voorafgaandelijk behandeld met chloormequat waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling aan een dosis van 0,36 l/ha overwogen worden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Zomervezels

Toepassingsstadium: gewashoogte: 40–50 cm.

Dosis: 0,9 l/ha, 1 toepassing.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing: De zaden van behandeld vlas niet in diervoeding gebruiken.

Bijzondere toepassingsvoorwaarden.

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Bereiding van de spuitoplossing.

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

Behandelen van de lege verpakkingen en de spuitoverschotten.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden)

ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoeiwater moet in de sproei-tank worden gegoten.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Algemene voorschriften.

- Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
- **Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.**

Eerste-hulpmaatregelen.

Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

NA INSLUKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Draag, zo mogelijk, beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij, schoenen en kraaksel. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk het noodnummer 112 bellen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Losse deeltjes van de huid afvegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Indien de kleding aan de huid kleef: eerst de kleding en huid met veel water afspoelen en pas daarna uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Draag zo mogelijk beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd contact met besmette kleding en schoenen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts: /

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Aanwijzingen voor de geneesheer.

Rehospitaal: Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Antigifcentrum: 070/245.245

Waarborg.

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.

De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

Ephon Top®

Propriétés et mode d'action.

Ephon Top® contient de l'éthéphon, un régulateur de croissance systémique. L'éthéphon migre vers les tissus de croissance active où il est décomposé en éthylène. Ainsi, les auxines qui sont responsables pour l'allongement des cellules sont inhibées.

Ethéphon réduit la croissance des tiges des céréales, qui les rend moins sensibles à la verse et ce qui facilite la récolte. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les cultures de céréales sont en bonne croissance et ont reçu les engrais et fongicides nécessaires.

Pour les cultures qui sont très sensibles à la verse, un traitement avec un produit agréé à base de chlorméquat suivie par un traitement avec Ephon Top® est préconisé.

Usages et doses d'emploi.

Pour éviter la verse (lodging) par réduction de la croissance des tiges: Orge d'hiver:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 37–39).

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,73–0,91 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Orge de printemps:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 37–39).

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,44–0,58 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Froment d'hiver:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 37–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,36 - 0,91 l/ha, sur du froment d'hiver non traité auparavant au chlorméquat. Dans les parcelles de froment préalablement traitées au chlorméquat où il existe encore un risque de verse, un traitement supplémentaire à la dose de 0,36-0,55 l/ha peut être envisagé..

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation.

Froment de printemps:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 37–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,36–0,91 l/ha, sur du froment de printemps non traité auparavant au chlorméquat.

Dans les parcelles de froment préalablement traitées au chlorméquat où il existe encore un risque de verse, un traitement supplémentaire à la dose de 0,36-0,55 l/ha peut être envisagé..

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Seigle d'hiver:

Stade d'application: le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 39–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 1,1 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Triticale d'hiver:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 37–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,36–0,91 l/ha, sur du triticale d'hiver non traité auparavant au chlorméquat.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Épeautre d'hiver:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 37–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,55 l/ha, sur d'épeautre d'hiver non traité auparavant au chlorméquat. Dans les parcelles d'épeautre préalablement traitées au chlorméquat où il existe encore un risque de verse, un traitement supplémentaire à la dose de 0,36 l/ha peut être envisagé.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Épeautre de printemps:

Stade d'application: la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même – gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille (BBCH 37–45)

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Dose: 0,55 l/ha, sur d'épeautre de printemps non traité auparavant au chlorméquat. Dans les parcelles d'épeautre préalablement traitées au chlorméquat où il existe encore un risque de verse, un traitement supplémentaire à la dose de 0,36 l/ha peut être envisagé.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Lin à fibre de printemps:

Stade d'application: hauteur de la culture: 40–50 cm

Mesures de réduction du risque:

- Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Avertissement(s):

- Ne pas utiliser les graines issues de lin traité pour l'alimentation animale.

Dose: 0,9 l/ha.

Nombre d'applications: 1

Méthode d'application: pulvérisation

Conditions particulières d'application.

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SP0: Ne pas pénétrer dans les cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- SP3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surfaces (voir mesures de réduction du risque).

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Préparation de la bouillie.

Remplir la cuve à moitié d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve.

Traitement des emballages vides et les surplus de traitement.

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau manuellement (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de rinçage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Mesures de précaution.

- Il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.
- **Conservé le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.**

Conseils de premiers secours.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Porter si possible des gants de protection pour administrer les premiers secours. Éviter le contact avec les vomissements, les chaussures et les vêtements contaminés. Appeler immédiatement le numéro d'urgence 112.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement le numéro d'urgence 112.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Si les vêtements collent à la peau: d'abord rincer les vêtements et la peau abondamment à l'eau avant de les enlever. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Porter si possible des gants de protection pour administrer les premiers secours. Éviter le contact avec les chaussures et les vêtements contaminés. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Remarques pour le médecin: /

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245.**

Pour le G-D du Luxembourg contacter: **(+352) 8002 550**

Garantie.

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur assume seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

SPECIMEN



EPHON[®] TOP

Régulateur de croissance

Pour réduire la verse en froment d'hiver, froment de printemps, orge d'hiver, orge de printemps, seigle d'hiver, triticale d'hiver, épeautre d'hiver, épeautre de printemps et Lin à fibre de printemps.

Groeiregulator

Ter voorkoming van legeren in winter- en zomergerst, winter- en zomertarwe, winter- en zomer-spelt, wintertriticale, winterrogge en zomervezelvlas.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 660 g/L ethefon
Concitré soluble à base de 660 g/L d'éthéphon.
Toelatingsnummer België / Numéro d'autorisation Belgique: 10941P/B
Numéro d'agrément Luxembourg: L02289-123

N° de lot: zie verpakking / voir emballage

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK /
EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

	Waarschuwingssinnen	Mentions de danger
H312	Schadelijk bij contact met de huid.	Nocif par contact cutané.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.	Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H411	Gifig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
	Veiligheidsaanbevelingen	Conseils de prudence
P260	Spuitnevel niet inademen.	Ne pas respirer les brumes de pulvérisation.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P284	Adembescherming dragen.	Porter un équipement de protection respiratoire.
P301+P330+P331+P310	NA INSLIKKEN: De mond spoelen; GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.	EN CAS D'INHALATION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P302+P361+P352+P310	BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés, laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P305+P351+P338+P310	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.
	Andere etiketelementen	Autres mentions
EUH 071	Bijtend voor de luchtwegen.	Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH 401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gevaar/Danger



UFI: WCJD-M236-CHAW-7V3D

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Nederland
Tel.: +31 10 303 77 25
www.nufarm.com/be



*: Geregistreerd handelsmerk van /
Marque enregistrée de Nufarm



5L^e

510009173_102024

