



ALAR[®] 85 SG

GROEIREGULATOR / RÉGULATEUR DE CROISSANCE

Groeiregulator voor het gebruik op sierplanten, sierbomen en -heesters (onder bescherming)
/ Régulateur de croissance pour utilisation en plantes ornementales, arbres et arbustes
ornementaux (sous protection)

TOELATINGSNUMMER	9457P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
AARD	GROEIREGULATOR / RÉGULATEUR DE CROISSANCE	NATURE
WERKZAME STOF	DAMINOZIDE	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	85 %	TENEUR
FORMULERINGSSTYPE	WATEROPLOSBAAR GRANULAAT (SG) / GRANULÉS SOLUBLES DANS L'EAU (SG)	TYPE DE FORMULATION
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS

Product bestemd voor beroepsgebruik. / Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: C3HM-Q3AJ-4K2J-0RHK

WAARSCHUWING/ATTENTION



Verdeeld door / distribué par:

UPL Benelux B.V. - Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda, The Netherlands

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation :

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A

4818 CP Breda, Nederland/PAYS-BAS

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking

NUMERO DE LOT: Voir emballage

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

BIEN AGITER AVANT EMPLOI

VORSTVRIJ BEWAREN

GARDER AL'ABRI DU GEL

* Gedeponneerd handelsmerk van / marque déposée de : UPL Holdings Coöperatief U.A.



www.agrirecover.eu

1KG
INHOUD / CONTENU



UPL



BE-2630002-04-0823



ALAR® 85 SG

GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSIS

NL

Lees aandachtig het etiket voor gebruik.

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingsstadium
Sierplanten (onder bescherming) Sierbomen en -heesters (onder bescherming)	Te lange bloemstelen. Product te gebruiken als groeiregulator, om de lengte van de bloemstelen te beperken en de bloemdichtheid te bevorderen.	50-500 g/100 l	Toepassing wanneer nieuwe stengelgroei 1-2 cm lang is
Toepassingsvoorwaarden - 1-12 toepassingen, met een interval van minstens 5 dagen. - Max. 12 toepassingen/teelt - Max. 15 kg/ha/12 maanden - In geval van toepassing met een rugsproeier, niet meer dan 0,1 ha/dag behandelen.			

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

- Het product mag alleen toegepast worden op droge, goed groeiende en niet verwelkte planten.
- 's Avonds toepassen.
- Het product in lauw water oplossen.
- Het product niet toepassen kort voor de bloemvorming.
- De mate waarin een sierplant op ALAR® 85 SG reageert is afhankelijk van diverse factoren als het tijdstip van toepassing, de groeisnelheid, het groeistadium, de belichting, de standplaats in de kas.

Dit betekent dat de kweker zelf de mogelijkheden van ALAR® 85 SG moet onderzoeken op eigen bedrijf en in verschillende omstandigheden, in vergelijking met niet behandelde planten.

Azalea:

Dosis: 300 tot 400 g/100 l water

Een hogere dosering dan 400 g/100 l water heeft een negatief effect op de bloemgrootte.



Hydrangea (hortensia):

Dosis: 400 tot 600 g/100 l water

Chrysant:

Dosis: 100 g/100 l water voor gevoelige variëteiten van troschrysanten;

250 tot 300 g/100 l water als normale dosis voor pot en snijchrysant;

500 tot 600 g/100 l water om sterk groeiende rassen onmiddellijk te kunnen remmen.

ANDERE VERMELDINGEN

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermij(en) te verkorten.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.
- In geval van toepassing met rugsproeier, niet meer dan 0,1 ha/dag behandelen.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245**



BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

Het product oplossen met water (0,5-5 g ALAR® 85 SG/liter water).

Roeren tot de vloeistof volkomen helder is (10-15 min). Aanlengen tot de benodigde hoeveelheid.

De spuitvloeistof niet gedurende de nacht of voor langere tijd in de spuittank laten staan. Bij voorkeur water gebruiken met een pH beneden de 7.

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit.

Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product.

De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



ALAR® 85 SG

USAGE ET DOSE D'EMPLOI

FR

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Plantes ornementales (sous protection) Arbres et arbustes ornementaux (sous protection)	Pédoncles floraux trop développés. Produit à utiliser comme régulateur de croissance, pour limiter la longueur des pédoncles floraux et favoriser la densité de floraison.	Max. 50-500 g/100 l	Traiter quand la nouvelle croissance atteint 1-2 cm
Conditions d'application - 1-12 applications, à intervalle de minimum 5 jours. - Max. 12 applications/culture. - Max. 15 kg/ha/12 mois. - En cas d'application avec un pulvérisateur à dos, ne pas appliquer plus de 0,1 ha/jour			

Remarques/recommandations générales

- Appliquer ALAR® 85 SG sur des plantes sèches, en pleine croissance et non flétries.
- Appliquer le produit le soir.
- Ne pas appliquer le produit juste avant la floraison.
- Dissoudre le produit dans de l'eau tiède.
- Le degré de réponse d'un végétal dépend de divers facteurs, tels que le stade végétatif, la vitesse de croissance, l'éclairage, l'emplacement etc. Ceci implique que l'utilisateur devra lui-même examiner les possibilités de l'ALAR® 85 SG pour sa propre exploitation et selon les différentes conditions, en comparaison avec des plantes non traitées.

Azalées:

Dose: 300-400 g/100 l d'eau

Une dose supérieure à 400 g/100 l d'eau a un effet négatif sur la grandeur des fleurs.

Hydrangeas (hortensias):

Dose: 400-600 g/100 l d'eau



Chrysanthèmes:

Dose:

250 g à 300 g/100 l d'eau pour les variétés à fleurs coupées et en pots;

100 g/100 l d'eau pour les variétés à fleurs coupées sensibles;

500 g à 600 g/100 l d'eau pour les variétés très vigoureuses, à croissance rapide.

AUTRES MENTIONS

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente.
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.
- En cas d'application avec un pulvérisateur à dos, ne pas traiter plus de 0,1 ha/jour.
- SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison **070/245.245**





PREPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Diluer le produit dans de l'eau (0,5-5 g ALAR® 85 SG/l d'eau). Mélanger jusqu'à l'obtention d'un produit limpide. (10-15 minutes). Ajouter la quantité d'eau nécessaire.

Procéder à la pulvérisation dès que la bouillie est prête. Utiliser de préférence de l'eau à pH inférieur à 7.

L'emballage vide doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation.

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.





ALAR[®] 85 SG

GROEIREGULATOR / RÉGULATEUR DE CROISSANCE

Groeiregulator voor het gebruik op sierplanten, sierbomen en -heesters (onder bescherming)
/ Régulateur de croissance pour utilisation en plantes ornementales, arbres et arbustes
ornementaux (sous protection)

TOELATINGSNUMMER	9457P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
AARD	GROEIREGULATOR / RÉGULATEUR DE CROISSANCE	NATURE
WERKZAME STOF	DAMINOZIDE	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	85 %	TENEUR
FORMULERINGSSTYPE	WATEROPLOSBAAR GRANULAAT (SG) / GRANULÉS SOLUBLES DANS L'EAU (SG)	TYPE DE FORMULATION
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS

Product bestemd voor beroepsgebruik. / Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling : een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: C3HM-Q3AJ-4K2J-0RHK

WAARSCHUWING/ATTENTION



Verdeeld door / distribué par:

UPL Benelux B.V. - Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda, The Netherlands

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation :

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A

4818 CP Breda, Nederland/PAYS-BAS

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking

NUMERO DE LOT: Voir emballage

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

BIEN AGITER AVANT EMPLOI

VORSTVRIJ BEWAREN

GARDER AL'ABRI DU GEL

* Gedeponoord handelsmerk van / marque déposée de : UPL Holdings Coöperatief U.A.



www.agrirecover.eu

1KG
INHOUD / CONTENU



BE-2630002-04-0823

