

Nieuw!

Axidor®

FUNGICIDEN

Systemisch fungicide met een specifieke werking tegen schimmels, zoals Pythium, Phytophthora spp. en valse meeldauw.



- Goede werking tegen Phytophthora spp. en valse meeldauw soorten
- Door combinatie van twee werkzame stoffen een goede curatieve, anti-sporulerende en systemische werking
- Snelle opname en direct effect (stopwerking)
- Uitstekend mengbaar met andere fungiciden
- Goede regenvastheid



AXIDOR NIEUWE TOELATING VOOR DE BOOMKWEKERIJ, BLOEMISTERIJ EN VASTE PLANTEN

Deze nieuwe toelating is tot stand gekomen door samenwerking tussen Arysta LifeScience en de sector Boomkwekerij, en is medegefinancierd vanuit de sector (Fonds Kleine Toepassingen).

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen, rozen (boomkwekerij), sierheesters en vaste planten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteit onderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

■ Toelating

Aridor is toegelaten in de onbedekte teelten van: bloemisterijgewassen, laanbomen, rozen (boomkwekerij), coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen- en struiken (boomkwekerij-

gewas) en vaste planten. Het is toegelaten voor de bestrijding van valse meeldauw (*Peronospora* spp.) en taksterfte (*Phytophthora citricola*, *Phytophthora cactorum*, *Phytophthora syringae*, *Phytophthora ilicis*).


Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket voor de toepassingsvoorwaarden en aanbevelingen.

Voor verdere informatie en/of advies adviseren wij u contact op te nemen met uw teeltadviseur.

■ Gewasveiligheid

Arysta LifeScience heeft in een viertal gewassen de gewasveiligheid getest (Groeibalans, 2016).

Aridor is 6 maal toegepast in een maximale dosering van 2,5 ltr/ha en is veilig gebleken in Rosa, Iberis, Galium en Buddleja.



v.l.n.r.: Rosa, Iberis, Galium, Buddleja

■ Resistentie management

Aridor bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

■ Emissie voorkomen

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.