

FLORAMITE® 240 SC

SELECTIEF WERKEND MIJTENBESTRIJDINGSMIDDEL
VOOR BEDEKTE SIERTEELTGEWASSEN



I N S E C T I C I D E

**VOOR EEN
EFFECTIEVE
CORRECTIE**

- Onmisbaar in spintbestrijding
- Goede werking op alle spintstadia: eieren, larven en adulten
- Past uitstekend in geïntegreerde teeltsystemen
- Zeer zacht voor het gewas

Meer informatie op:

www.upl-ltd.com/nl





FLORAMITE® 240 SC

FLORAMITE is een selectief werkend mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in sierteeltgewassen in kassen. FLORAMITE heeft een goede werking op bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*).

DE WERKING

De werkzame stof in FLORAMITE is bifenazaat (240 g/l) en heeft effect op het energiemetabolisme van spintmijten. Bifenazaat blokkeert het elektronentransport in de mitochondriën van spintmijten.

Mijten die in contact komen met FLORAMITE stoppen na ongeveer 3 uur met voeden. Daarnaast worden de mijten hyperactief. Binnen 3 tot 4 dagen begint de sterfte van de populatie en na 7 dagen is een optimaal effect te zien. FLORAMITE is voornamelijk effectief op de bewegelijke stadia van spint, bij adulten en larven, maar kent ook effectiviteit op eieren.



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vullen van de tank


Gebruik schoon water voor het vullen van de spuittank. Vul de tank eerst met de helft van de benodigde spuihoeveelheid. Voeg daarna FLORAMITE toe. Geadviseerd wordt om FLORAMITE niet te mengen met andere insecticiden.

Dosering en bespuiting

Gebruik bij toepassing een dosering van 0,04% (40 ml / 100 L water). Verlaag deze dosering niet, want de kans op resistentie wordt hierdoor vergroot. Toepassing in een blok bespuiting van 2 toepassingen met een interval van 7 dagen (maximaal 4 toepassingen per jaar). FLORAMITE heeft geen translaminare of systemische werking. Het is daarom van belang dat de bespuiting goed wordt uitgevoerd. Een goede bedekking is belangrijk voor een goede effectiviteit. Het toevoegen van een super-uitloeier, zoals SILWET GOLD kan bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit van de bespuiting.




Effectiviteit % van FLORAMITE 240 SC tegen spint *Tetranychus urticae* in chrysant (Nederland, 2015)



Dosering FLORAMITE 0,04% (40ml/hl), dosering SILWET GOLD 0,02% (20ml/hl). De effectiviteit van FLORAMITE en FLORAMITE + SILWET GOLD is beoordeeld 20 dagen na toepassing.

Effectiviteit na beregenen 6 uur na toepassing

% spintmijt sterfte



Resistentie ontwikkeling voorkomen

Het is belangrijk dat insecticiden als FLORAMITE op de juiste manier worden ingezet. Het productetiket is hierin leidend. Het zorgvuldig opvolgen van het etiket is van belang om resistentieontwikkeling te voorkomen en de werkzaamheid van middelen te behouden. Ook het afwisselen van middelen met een verschillend werkingsmechanisme is belangrijk.

Regenvastheid

FLORAMITE kent een goede regenvastheid. Een regenbui of watergift 6 uur na de behandeling heeft geen invloed meer op de effectiviteit van FLORAMITE.

Dit maakt het mogelijk om FLORAMITE te gebruiken zonder zorgen over het afregenen (door irrigatie).

INTEGREERBAAR MET BIOLOGISCHE BESTRIJDERS

FLORAMITE heeft geen werking op de meeste biologische bestrijders en dus heel goed toepasbaar in geïntegreerde teeltsystemen.

Veilig te gebruiken in combinatie met:

- *Amblyseius californicus*
- *Amblyseius cucumeris*
- *Amblyseius swirskii*
- *Aphidius colemani*
- *Aphidius rhopalosiphi*
- *Aphidoletes aphidimyza*
- *Chrysopa carnea*
- *Coccinella septempunctata*
- *Diglyphus isaea*
- *Encarsia formosa*
- *Eretmocerus ermicus*
- *Feltiella acarisuga*
- *Nesidiocoris tenuis*
- *Orius insidiosus*
- *Orius laevigatus*
- *Phytoseiulus persimilis*
- *Typhlodromus pyri*




BLOEMISTERIJ- EN BOOMKWEKERIJGEWASSEN

In de bloemisterij- en boomkwekerijgewassen teelten is FLORAMITE een goede toevoeging op spintbestrijding:

- Zacht voor gewassen
- Een snelle beperking van cosmetische schade door het stoppen van vraat
- Geen zichtbare residuen

Onderstaande grafiek geeft de effectiviteit van FLORAMITE weer in percentage ten opzichte van een onbehandelde controle. Weergegeven zijn de waarnemingen gedaan 7, 13 en 20 dagen na de tweede toepassing.

Effectiviteit % van FLORAMITE 240 SC tegen spint *Tetranychus urticae* in chrysant (Nederland, 2015)



Dosering FLORAMITE 240 SC 0,04% (40ml/hl), dosering SILWET GOLD 0,02% (20ml/hl)



FLORAMITE 240 SC®

Wettelijk Gebruiksvoorschrift W4

TOEPASSINGSGEBIED	WERKZAAMHEID GETOETST OP	DOSERING* MIDDEL <i>per</i> <i>toepassing</i>	MAX. DOSERING MIDDEL <i>per toepassing</i>	MAX. AANTAL TOEPASSINGEN <i>per teeltcyclus of</i> <i>per 12 maanden</i>	MIN. INTERVAL TUSSEN TOEPAS- SINGEN <i>in dagen</i>
AARDBEI, OPKWEK- EN VERMEERDERINGS TEELT (<i>bedekte teelt</i>)	Mijten ¹	0,04% (40 ml <i>middel per 100 L</i> <i>water</i>)	0,40 L/ha	2 per teeltcyclus (blok), 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
BLOEMISTERIJ- GEWASSEN (<i>bedekte teelt</i>)	Mijten ¹	0,04% (40 ml <i>middel per 100 L</i> <i>water</i>)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
BOOMKWEKERIJ- GEWASSEN (<i>bedekte teelt</i>)	Mijten ¹	0,04% (40 ml <i>middel per 100 L</i> <i>water</i>)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken
VASTE PLANTENTEELT (<i>bedekte teelt</i>)	Mijten ¹	0,04% (40 ml <i>middel per 100 L</i> <i>water</i>)	0,60 L/ha	2 per blok, 4 per 12 maanden	7 per blok en 56 tussen twee blokken

¹ *bonenspintmijt (Tetranychus urticae)*

* *Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.*

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof bifenazaat. De Irac code is niet vastgesteld. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.



UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A, 4818 CP Breda, Nederland

T: 31 (0)85-0712300 - **E:** uplbenelux.info@upl-ltd.com - **W:** www.upl-ltd.com/nl