

UPL Captan®

FUNGICIDE/FONGICIDE

Fungicide ter bestrijding van schimmelziekten in talrijke teelten (fruit- en sierteelt)
Fongicide pour combattre les maladies cryptogamiques dans de nombreuses cultures
(fruiteres et ornementales)

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation : 9190P/B

Lotnummer en productiedatum / Numéro de lot et date de production : zie verpakking / voir emballage

**LEES AANDACHTIG HET ETIKET /
LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE**

® Gedeponiseerd handelsmerk van / Marque déposée
d' Arysta LifeScience North America Corporation

**Water disperseerbaar granulaat (WG)
op basis van 800 g/kg captan**

**Granulés à disperser dans l'eau (WG)
contenant 800 g/kg de captane**

**Product bestemd voor beroepsgebruik /
Produit destiné à un usage professionnel**

Erkend door / Agréé par:
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix BP80
64150 Noguères
France

Verdeeld door / Distribué par :
UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, 4818 CP Breda
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

UFI : A9AX-KNRA-FH2S-CP9A

GEVAAR / DANGER

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261 Inademing van stof en spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water gedurende minstens 15 minuten.
P305+P351+P338 Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SPe2 Om de waterorganismen te beschermen, mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden, is het gebruik wel toegestaan.
SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is M04.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

CONSEILS DE PRUDENCE:

P261 Eviter de respirer les poussières et les brumes de pulvérisation.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
P391 Recueillir le produit répandu.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en oeuvre.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est M04.

Antigifcentrum/ Centre Antipoisons: +32 (0)70 245 245

UN 3077



10 KG
NETTO GEWICHT / POIDS NET



- Opmerkingen**
- UPLCaptan® niet toepassen op de peervariëteiten Brederode, Président Loutreuille en Beurré d'Anjou en op de appelvariëteit Winston wegens gevaar voor gewasbeschadiging.
 - De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
 - Schudden de spuitvloeistof voortdurend tijdens de toepassing.
 - De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating.
 - Omwille van wisselende teeltvoorwaarden bij vele verschillende soorten en variëteiten van sierplanten, kunnen wij geen algemeen bindende uitspraak doen over de selectiviteit van het product. Wij raden daarom aan om op enkele planten een tolerantietest uit te voeren in elk gewasstadium en bij diverse teeltvoorwaarden; indien het resultaat voldoet, dan pas kan de hele teelt behandeld worden. Het toepassingsrisico ligt bij de gebruiker, aansprakelijkheid van de erkenningshouder is uitgesloten.
 - Draag altijd beschermende basiskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermende kleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en waterdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Vernietiging van verpakkingen behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden op de daartoe voorziene inzamelpunten. Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden.

Garantie

Wij garanderen de kwaliteit van ons product. Gezien de toepassing van dit product aan onze contro le ontsnapt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die uit een slechte toepassing zouden kunnen voortvloeien.

Eerste-hulpmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aange tastte oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245



- Remarques**
- Ne pas appliquer UPLCaptan® sur les variétés de poires Brederode, Président Loutreuille et Beurré d'Anjou et sur la variété de pommes Winston en raison du risque de dégâts.
 - La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
 - Agiter constamment la bouillie de pulvérisation lors de l'application.
 - Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.
 - Du fait des conditions variables de culture pour de nombreuses sortes et variétés différentes de plantes ornementales, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon générale et contractuelle au sujet de la sélectivité du produit. Nous conseillons d'effectuer pour cette raison un test de tolérance sur quelques plantes dans chaque étape de croissance et sous diverses conditions de culture; si le résultat est satisfaisant, alors seulement la culture entière pourra être traitée. L'application se fait au risque de l'utilisateur, toute responsabilité du détenteur d'homologation est exclue.
 - Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare. Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés.

Garantie

Le fabricant garantit uniquement la qualité du produit. Ne pouvant contrôler l'application et l'emploi, il ne peut garantir les résultats et n'accepte aucune responsabilité pour des dégâts qui pourraient résulter de l'application.

Conseils de premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

Toepassing	Gebruiks dosis	Veiligheid-stermiin	Application	Dose d'emploi	Délai avant récolte
APPEL- EN PERENBOMEN EN KWEEPEER (open lucht) Tegen schurft (<i>Venturia</i> sp.) Tegen Gloeosporiumrot (<i>Gloeosporium</i> spp.) Na half juni	Max. 10 toepassingen/12 maanden Preventief 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-10 toepassingen met een interval van 7-10 dagen 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-4 toepassingen met een interval van 7-10 dagen Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek	28 dagen	POMMIERS, POIRIERS ET COING (plein air) Contre la tavelure (<i>Venturia</i> sp.) Contre la pourriture amère (<i>Gloeosporium</i> spp.) Après mi-juin	Max. 10 applications/12 mois Préventivement 1,2 kg/ha de haie fruitière, 1-10 applications à intervalle de 7 à 10 jours 1,2 kg/ha de haie fruitière, 1-4 applications à intervalle de 7 à 10 jours Mesures anti-dérive: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%	28 jours
PRUIMENBOMEN (open lucht) Tegen vruchtrot (<i>Monilinia fructigena</i> / <i>M. laxa</i>) Vóór en tijdens de bloei, bij de val van het bloemblad	Max. 3 toepassingen/ 12 maanden Preventief 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek	21 dagen	PRUNIERS (plein air) Contre la moniliose (<i>Monilinia fructigena</i> / <i>M. laxa</i>) Avant et pendant la floraison, à la chute des pétales	Max. 3 applications/ 12 mois Préventivement 1,2 kg/ha de haie fruitière, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours Mesures anti-dérive: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%	21 jours
KERSEN - EN KRIEKENBOMEN (open lucht) Tegen vruchtrot (<i>Monilinia fructigena</i> / <i>M. laxa</i>) Tegen grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) Vóór en tijdens de bloei, bij de val van het bloemblad en tijdens het seizoen indien nodig	Max. 3 toepassingen/ 12 maanden Preventief 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen 1,2 kg/ha fruitboomhaag, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek	14 dagen	CERISIERS ET GRIOTTIERS (plein air) Contre la moniliose (<i>Monilinia fructigena</i> / <i>M. laxa</i>) Contre la pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Avant et pendant la floraison, à la chute des pétales et pendant la saison si nécessaire	Max. 3 applications/12 mois Préventivement 1,2 kg/ha de haies fruitières, 1-3 applications à intervalle de 7-10 jours 1,2 kg/ha haies fruitières, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours Mesures anti-dérive: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%	14 jours
AARDBEEN (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming en in open lucht) Tegen grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) Vanaf het begin van de bloei	Max. 2 toepassingen/ 12 maanden Preventief 1,2 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen Driftreducerende maatregelen (open lucht): Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek. Bijkomende opmerking voor de aardbeien (productieveld, onder bescherming, niet grondgebonden): Het gebruik is enkel toegelaten in gesloten waterrecirculatiesystemen. Het door het product gecontamineerde water mag in geen enkel geval in contact komen met het oppervlaktewater. Max. 2 toepassingen/cultuur.	14 dagen (productie- veld)	FRAISIERS (champ de production, champ de sélection et de multiplication) (sous protection et en plein air) Contre la pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) A partir du début de floraison	Max. 2 applications/12 mois Préventivement 1,2 kg/ha, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours Mesures anti-dérive (plein air): Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique. Remarque additionnelle pour les fraisières (champ de production, sous protection, non liées au sol): L'usage n'est autorisé que dans les systèmes fermés avec recirculation de l'eau. Les eaux contaminées par le produit ne peuvent, en aucun cas, entrer en contact avec les eaux de surface. Max 2 applications/culture.	14 jours (champ de production)
SIERPLANTEN (EENJARIGE) (open lucht en onder bescherming) Tegen grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>)	Max. 2 toepassingen/12 maanden Preventief 0,12 kg/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen Driftreducerende maatregelen (open lucht): Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek	/	PLANTES ORNAMENTALES (ANNUELLES) (plein air et sous protection) Contre la pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>)	Max. 2 applications/12 mois Préventivement 0,12 kg/100 l, 1-2 applications à intervalle de 10 jours Mesures anti-dérive (plein air): Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.	/
SIERPLANTEN MET BOLLEN, KNOLLEN OF WORTERLSTOKKEN (open lucht en onder bescherming) Tegen Fusarium	Preventief De bollen vlak voor het planten gedurende 30 min. dompelen in een suspensie van 10 g/l, 1 toepassing	/	PLANTES ORNAMENTALES A BULBES, TUBERCULES OU RHIZOMES (plein air et sous protection) Contre la fusariose (<i>Fusarium</i> spp.)	Préventivement Trempier les bulbes juste avant la plantation pendant 30 min dans une suspension à 10 g/l, 1 application	/
SIERBOMEN EN - HEESTERS (open lucht en onder bescherming) Tegen schurft (<i>Venturia</i> en <i>Spilocaea</i>) Vanaf het verschijnen van de eerste symptomen. Gezien de gevoeligheid van sommige soorten is het aanbevolen een proefbespuiting uit te voeren alvorens de toepassing te veralgemenen	Max. 2 toepassingen/ 12 maanden Preventief 0,15 kg/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen Driftreducerende maatregelen (open lucht): Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek	/	ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX (plein air et sous protection) Contre la tavelure (<i>Venturia</i> et <i>Spilocaea</i>) A l'apparition des premiers symptômes. Vu la sensibilité de certaines espèces, il est conseillé à l'utilisation de faire un essai avant de généraliser le traitement.	Max. 2 applications/12 mois Préventivement 0,15 kg/100 l, 1-2 applications à intervalle de 7-10 jours. Mesures anti-dérive (plein air): Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.	/

GEBUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van UPLCaptan® in de teelten hieronder vermeld is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassing	Gebruiks dosis	Veiligheid-stermiin	Application	Dose d'emploi	Délai avant récolte
FRAMBOZENSTRIJKEN (onder bescherming) Grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn oogstrijp (BBCH 60-89) Einde van de groei van de twijg - begin van de bladval (BBCH 91-93)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen 0,9 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen	7 dagen	FRAMBOISIERS (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Les premières fleurs sont ouvertes - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte (BBCH 60-89) Fin de la croissance des rameaux, les feuilles sont toujours vertes - début de la chute des feuilles (BBCH 91-93)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours 0,9 kg/ha de haie, 1-3 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
BRAAMSTRIJKEN (onder bescherming) Grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn oogstrijp (BBCH 60-87) Einde van de groei van de twijg - begin van de bladval (BBCH 91-93)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen 0,9 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen	7 dagen	RONCES (MÛRES) (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Les premières fleurs sont ouvertes - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte (BBCH 60-87) Fin de la croissance des rameaux, les feuilles sont toujours vertes - début de la chute des feuilles (BBCH 91-93)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours 0,9 kg/ha de haie, 1-3 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
BLAUWE/RODE BOSBESSEN (onder bescherming) Grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn oogstrijp (BBCH 60-87) Begin van de bladval - einde van de bladval (BBCH 93-97)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen 0,9 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen	7 dagen	MYRTILLES/AIRELLES ROUGES (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Les premières fleurs sont ouvertes - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte (BBCH 60-87) Début de la chute des feuilles - fin de la chute des feuilles (BBCH 93-97)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours 0,9 kg/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
AALBESSEN (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) Grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn oogstrijp (BBCH 60-87) Begin van de bladval - einde van de bladval (BBCH 93-97)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen 0,9 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen	7 dagen	GROSEILLIERS (blancs, rouges, cassis) (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Les premières fleurs sont ouvertes - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte (BBCH 60-87) Début de la chute des feuilles - fin de la chute des feuilles (BBCH 93-97)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours 0,9 kg/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
STEKELBES (kruisbes) EN KRUISINGEN (onder bescherming) Grauwe schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn oogstrijp (BBCH 60-87) Begin van de bladval - einde van de bladval (BBCH 93-97)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met een interval van 7 dagen 0,9 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen	7 dagen	GROSEILLIERS À MAQUEREAU ET HYBRIDES (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Les premières fleurs sont ouvertes - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte (BBCH 60-87) Début de la chute des feuilles - fin de la chute des feuilles (BBCH 93-97)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours 0,9 kg/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
VEENBESSEN (onder bescherming) Grauwe Schimmel (<i>Botrytis cinerea</i>) De eerste bloemen zijn geopend - de vruchten zijn plukrijp: de meeste bessen zijn rijp (BBCH 60-87)	Max. 6 toepassingen/12 maanden 0,9 kg/ha haag, 1-6 toepassingen met interval van 7 dagen	7 dagen	AIRELLES CANNEBERGES (sous protection) Pourriture grise (<i>Botrytis cinerea</i>) Fin de la floraison: tous les pétales sont tombés - les fruits ont atteint la maturité demandée pour la récolte : la plupart des baies sont mûres (BBCH 60-87)	Max. 6 applications/12 mois 0,9 kg/ha de haie, 1-6 applications à intervalle de 7 jours	7 jours
Na de oogst	0,9 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met interval van 7 dagen		Après la récolte	0,9 kg/ha de haie, 1-2 applications à intervalle de 7 jours	

USAGES CONFORMES A L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT 1107/2009

L'utilisation du produit UPLCaptan® dans les cultures mentionnées ci-dessous a été évaluée conformément à l'article 51 du Règlement européen 1107/2009. Aucune étude d'efficacité ou de phytotoxicité n'a été effectuée pour cet usage. Il est donc recommandé d'effectuer un essai de pulvérisation avant d'utiliser le produit. L'utilisation de ce produit dans ces cultures tombe donc sous la responsabilité de l'utilisateur.