

MALVIN® WG

FUNGICIDE

Malvin® WG

Toelatingsnummer: 16292 N

Naam van het middel: Malvin WG

Aard van het preparaat:

Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof: Captan

Gehalte (eenheid technisch): 80%

Werking: fungicide

Toelatingshouder:

Arysta LifeScience S.A.S.

Route d'Artix - BP 80

F-64150 Nogueres

Frankrijk

Distributeur:

UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144A

4818 CP Breda

085-0712300

www.upl-ltd.com/nl

Inhoud: 5 Kg

Fabricage datum, Charge nr. :

zie opdruk verpakking

Hergebruik van deze
verpakking is niet toegestaan.



www.agrirecover.eu

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld, zoals
wettelijk is voorgeschreven.

Professioneel gebruik de identiteit van alle stoffen in het mengsel die
bijdragen tot de indeling van het mengsel: captan

GEVAAR

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P201 Alvorens te gebruiken de

speciale aanwijzingen raadplegen.

P280 Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk.

Blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P308 + P313 Na (mogelijke)
blootstelling: een arts raadplegen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.

UFI: U7CX-5NAP-UH27-NEQ1



5 KG



Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toespraak is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieflijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toe- passing	Maximaal aantal toepassing per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toe- passing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Appel	Gewasbehandeling	Schurft ¹	0,125% (125 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	15 per 12 maanden	27 kg/ha per 12 maanden	7	28
		Bewaarrot ² Bewarschurft ³	0,15 % (150 g per 100 l water)	2,25 kg/ha	10 per 12 maanden		10	
		Bewaarrot ² Bewarschurft ³	0,06 % (60 g per 100 l water)	0,72 kg/ha	4 per 12 maanden		7	
	Gewasbehandeling na de oogst	Vruchtboomkanker ⁴	0,25 % (250 g per 100 l water)	2,5 kg/ha	2 per 12 maanden	5 kg per ha per 12 maanden	7	-
Peer	Gewasbehandeling	Schurft ⁴	0,125% (125 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	15 per 12 maanden	27 kg/ha per 12 maanden	7	28
		Bewaarrot ² Bewarschurft ⁴	0,15 % (150 g per 100 l water)	2,25 kg/ha	10 per 12 maanden		10	
		Bewaarrot ² Bewarschurft ⁴	0,06 % (60 g per 100 l water)	0,72 kg/ha	4 per 12 maanden		7	
	Gewasbehandeling na de oogst in het najaar	Vruchtboom kanker ⁴	0,25 % (250 g per 100 l water)	2,5 kg/ha	2 per 12 maanden	5 kg per ha per 12 maanden	7	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot (grauwe schimmel) ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	0,9 kg/ha	2 per 12 maanden	1,8 kg/ha per 12 maanden	10	14
Aardbei (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot (grauwe schimmel) ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	2 per 12 maanden	3,6 kg/ha per 12 maanden	10	14
Aalbes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	6 per 12 maanden	16,2 kg/ha per 12 maanden	7	7
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	2 per 12 maanden		7	-
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	1 per 12 maanden		-	-
Kruisbes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	6 per 12 maanden	16,2 kg/ha per 12 maanden	7	7
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	2 per 12 maanden		7	-
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	1 per 12 maanden		-	-
Blauwe bes (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	6 per 12 maanden	16,2 kg/ha per 12 maanden	7	7
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	2 per 12 maanden		7	-
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	1 per 12 maanden		-	-
Braam (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	6 per 12 maanden	16,2 kg/ha per 12 maanden	7	7
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3 per 12 maanden		7	-
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3 per 12 maanden		-	-
Framboos (bedekte teelt)	Gewasbehandeling van bloei tot oogst	Bloesemrot en vruchtrot ⁶	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	6 per 12 maanden	16,2 kg/ha per 12 maanden	7	7
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3 per 12 maanden		7	-
		Botrytis-stengelziekte ⁵	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3 per 12 maanden		-	-
Bloemisterij- gewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Bladvlekkenziekte ⁷ Oortjesziekte ⁸ Kiemplantenziekte ⁹ Voetrot ¹⁰ Kroonrot ¹¹	0,15–0,20 % (0,150–20 kg per 100 l water)	2,4 kg/ha	5 per 12 maanden	12 kg/ha per 12 maanden	7	-
		blad- en twijgziekte ¹² schurft ¹³ roetdauw ¹⁴ Exobasidium ^{15,16} oortjesziekte ¹⁷	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,5 kg/ha	5 per 12 maanden	7,5 kg/ha per 12 maanden	10	-
		blad- en twijgziekte ¹² schurft ¹³ roetdauw ¹⁴ Exobasidium ^{15,16} oortjesziekte ¹⁷	0,15–0,2 % (150–200 g per 100 l water)	2 kg/ha	5 per 12 maanden	10 per 12 maanden	10	-
Vaste planten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	bladvlekkenziekte ¹⁸ vlekkenziekte ¹⁹	0,15–0,2 % (150–200 g per 100 l water)	2 kg/ha	5 per 12 maanden	10 per 12 maanden	10	-

- 1 Venturia inaequalis
- 2 Gloeosporium
- 3 Nectria galligena
- 4 Venturia prina
- 5 Botryotinia fuckeliana
- 6 Didymella applanata

- 7 Colletotrichum acutatum
- 8 Septoria spp.
- 9 Exobasidium spp.
- 10 Pythium spp., Fusarium spp.
- 11 Rhizoctonia spp.
- 12 Colletotrichum spp.

- 11 Rhizoctonia spp., Sclerotium spp.
- 12 Venturia macularis
- 13 Venturia spp.
- 14 Roetdauw
- 15 Exobasidium vaccinii

- 16 Exobasidium rhododendri
(Rododendronbladgast)
- 17 Exobasidium vaccinii var. japonicum
- 18 Ramularia agrestis (bladvlekkenziekte)
- 19 Mycoctospora acerina (vlekkenziekte)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (mid- del) per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden of per teeltcyclus	Minimum interval tussen toe- passing en in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Kers (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot ²⁰ grauwe schimmel ²¹	0,15% (150 g per 100 l water)	2,25 kg/ha	3	6,75	7	21
Pruim (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Vruchtrot ²⁰ grauwe schimmel ²¹	0,15% (150 g per 100 l water)	2,25 kg/ha	4	9	10	21
Aalbes, kruisbes, blauwe bes (onbedekte teelt)	Neerwaarts spuiten, van bloei tot einde bloei de oogst.	Bloesemrot (grauwe schimmel) ²²	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3	10,8 kg/ha	7	7
		Botrytisstengelziekte ²¹	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	2		7	-
		Neerwaarts spuiten, na wintersnoei	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	1			-
		Bloesemrot ²³	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3	10,8 kg/ha	7	7
Braam (onbedekte teelt)	Neerwaarts spuiten, van bloei tot einde bloei de oogst.	Botrytisstengelziekte ²¹	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3		7	-
		Bloesemrot ²³	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3	10,8 kg/ha	7	7
		Botrytisstengelziekte ²¹	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3		7	-
Framboos (onbedekte teelt)	Neerwaarts spuiten, van bloei tot einde bloei de oogst.	Bloesemrot ²³	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3	10,8 kg/ha	7	7
		Botrytisstengelziekte ²¹	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3		7	-
		Botrytisstengelziekte ²¹	0,15 % (150 g per 100 l water)	1,8 kg/ha	3		7	-
Vruchtbomen en struiken (boomk- wekerigewas, onbedekte teelt); moerbelden, 1 ^{ste} , 2 ^{de} en 3 ^{de} jaars teelt van vruchtbomen	Neerwaarts spuiten	schurft ¹	0,12 % (120 g per 100 l water)	1,2 kg/ha	15	18 kg/ha	7	-
Buxus (onbedekte teelt)	neerwaarts spuiten	Blad- en taksterfte ²²	0,12% (120 g per 100 l water)	1,2 kg/ha	15	18 kg/ha	7	-

- ¹Venturia inaequalis
²Nectria galligena
³Didymella applanata
⁴Monilia
⁵Botrytis cinerea/ Botryotinia fuckeliana
⁶Cylindrocladium buxicola

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas. In de onbedekte teelt de zij- en opwaartse bespuiting uitsluitend toepassen met een machinaal voortbewogen spuit.

Het middel in de teelt van kers alleen toepassen vanaf de bloei (BBCH 61). Het middel in de teelt van pruim alleen toepassen vanaf het opzwellen van de bloemknoppen (BBCH 51).

Het middel in vruchtbomen en struiken (boomkwekerigewas, onbedekte teelt) tegen schurft niet toepassen na BBCH 85 (gevoerde afrijping). In de teelt van appel en peer mag Malvin WG maximaal 15 keer per seizoen worden toegepast, waarvan maximaal 13 toepassingen mogen plaatsvinden in de periode na einde van de bloei tot aan de oogst (BBCH 70-85).

Het middel is giftig voor waterorganismen, daarom zodanig toepassen dat het middel niet in oppervlaktewater terecht komt. Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van appel, peer, kers en pruim op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien:
- voor 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:
- een techniek uit tenminste de klasse DRT99, of
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 met een teeltvrije zone van 450 centimeter
- vanaf 1 mei op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van opzetter (laanbomen) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, of tenminste een standaard axiaal- of dwarsstroomspuit in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 1000 centimeter. In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten *.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van hoge laanbomen (laanbomen) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van tenminste een standaard axiaal- of dwarsstroomspuit in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 1000 centimeter. In deze teeltvrije zone mogen gewassen geteeld worden van tenminste dezelfde hoogte als het te bespuiten gewas, waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten *.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

* Deze gewassen dienen gekozen te worden uit het CIW rapport vermeld in de Nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit, Artikel 3.80: Op grond van het vijfde lid moet voor de opwaarts bespoten boomkwekerigewassen, zoals laan- en parkbomen, een teeltvrije zone van tenminste 500 cm worden aangehouden. In de teeltvrije zone, mogen gewassen geteeld worden waarin geen gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten. Dit komt overeen met de CIW aanbevelingen (Commissie Integraal Waterbeheer, 1998. Protocol opwaarts spuiten voor (laan)bomen) voor de verpunningverlening, waarin bovendien een lijst van gewassen is opgenomen die niet bespoten worden.

EERSTE HULPMAATREGELEN:

Algemeen: Noot bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
Na inademing: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Na contact met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
Na contact met de ogen: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Een arts raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.
Na inslikken: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

N.B. Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de na zorgvuldig onderzoek-opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van UPL zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat UPL in verband hiermee geen aansprakelijkheid kan accepteren

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

