

OBLIX[®] 500 SC

HERBICIDE

Oblix 500 SC is een voor- en na- opkomst herbicide voor de bestrijding van éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden, vaak in combinatie met andere daarvoor toegelaten middelen.

Oblix 500 SC est un type herbicide de pré- et post-émergence pour le contrôle des graminées et dicotylées annuelles, souvent en combinaison avec d'autres produits agréés pour ces usages.

TOELATINGSNUMMER 8139P/B

WERKZAME STOF ETHOFUMESAAT / ÉTHOFUMÉSATE

GEHALTE 500 G/L

FORMULERINGSTYPE SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) /
SUSPENSION CONCENTRÉ (SC)

ANTIGIFCENTRUM 070/245.245

BEVAT 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on/
1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one

Product bestemd voor
beroepsgebruik.

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking
NUMERO DE LOT: Voir emballage
PRODUCTIEDATUM: Zie op de verpakking
DATE DE FABRICATION: Voir sur l'emballage

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK/ BIEN AGITER AVANT
L'EMPLOI.

VORSTVRIJ BEWAREN/CONSERVER À L'ABRI DU GEL.

® Gedeponiseerd handelsmerk van/ Marque déposée de:
UPL Holdings Coöperatief U.A

**NUMÉRO
D'AUTORISATION**

MATIÈRE ACTIVE

TENEUR

TYPE DE FORMULATION

CENTRE ANTIPOISONS

CONTIENT

Produit destiné à un usage
professionnel.

**Toelatingshouder/détenteur de
l'autorisation:**

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF
U.A.
CLAUDIUS PRINSENLAAN
144A, BLOK A, 4818 CP BREDA,
NEDERLAND

Verdeeld door/ distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok
A, 4818 CP, Breda,
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 15 HERBICIDE



8 717185 522785 >

5L
INHOUD / CONTENU



OBLIX® 500 SC

TOELATINGSNUMMER

8139P/B

NUMÉRO D'AUTORISATION

WERKZAME STOF

ETHOFUMESAAT / ÉTHOFUMÉSATE

MATIÈRE ACTIVE

GEHALTE

500 G/L

TENEUR

FORMULERINGSTYPE

SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) /
SUSPENSION CONCENTRÉ (SC)

TYPE DE FORMULATION

ANTIGIFCENTRUM

070/245.245

CENTRE ANTIPOISONS

BEVAT

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on/
1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one

CONTIENT

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage
professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige
gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermende handschoenen,
beschermende kleding en
gelaatsbescherming dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Waarschuwing/Attention



MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 Porter des gants de protection,
des vêtements de protection et un
équipement du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-
3(2H)-one. Peut produire une réaction
allergique.

EUH401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour
la santé humaine et l'environnement.

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation:

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
CLAUDIUS PRINSENLAAN 144A, BLOK A
4818 CP BREDA, NEDERLAND

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking

NUMERO DE LOT: Voir emballage

PRODUCTIEDATUM: Zie op de verpakking

DATE DE FABRICATION: Voir sur l'emballage



Verdeeld door/ distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,
4818 CP, Breda, The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK/ BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

VORSTVRIJ BEWAREN/CONSERVER À L'ABRI DU GEL.

® Gedeponoord handelsmerk van/ Marque déposée de: UPL
Holdings Coöperatief U.A

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 15 HERBICIDE

5L
INHOUD / CONTENU



Oblix 500 SC is een voor- en na-opkomst herbicide voor de bestrijding van éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden, vaak in combinatie met andere daarvoor toegelaten middelen.

Algemeen

Oblix 500 SC kan worden toegepast ter bestrijding van diverse éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden. Oblix 500 SC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Hierbij worden de beste resultaten verkregen bij toepassing op een vochtige grond. Ook regenval na de toepassing komt de werking ten goede. Oblix 500 SC heeft ook enige contactwerking, vooral in combinatie met andere middelen.

Maximaal 1 kg ethofumesaat als werkzame stof per hectare per 36 maanden toepassen.

Toepassingen

Suiker-, voeder- en rode bieten voor zaai tot voor opkomst (open lucht): Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden, duist, straatgras, windhalm, vogelmuur en graanopslag. Hierbij wordt het product bij voorkeur toegepast voor de zaai en ingewerkt in de bodem, vooral bij droogte.

Dosering: 2 l/ha, eventueel gefractioneerd. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Suiker-, voeder- en rode bieten kiembladeren horizontaal ontvouwen, eerste blad zichtbaar (grootte van speldenkop) - 8 bladeren ontvouwen (BBCH 10-18) (open lucht): Ter bestrijding van éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals kleeftuif, vogelmuur, bingelkruif en duizendknopigen. Het product gefractioneerd toepassen bij voorkeur in combinatie met voor deze toepassing erkende herbiciden in 200-400 liter water per hectare.

In totaal maximaal 0,8 l/ha Oblix 500 SC na opkomst toepassen. De toepassing kan op diverse manieren uitgevoerd worden:

Dosering: 0,4-0,8 l/ha, eventueel gefractioneerd. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden

a. Vanaf het kiembolstadium van de bieten, kort na opkomst van de onkruiden: 0,2 l/ha Oblix 500 SC + 0,5 l/ha fenmedifam (160g/l) + 0,5 l/ha metamitron (700g/l). Indien gewenst kan 0,5 l/ha erkende olie worden toegevoegd. De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen bovenstaande doseringen worden verdund.

b. Vanaf het 2-blad-stadium van de bieten: 0,6 l/ha Oblix 500 SC + 3 l/ha fenmedifam (160g/l). Deze combinatie wordt vooral geadviseerd tegen duizendknoopachtigen en kleeftuif.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Italiaans en Engels raigras (graszaadteelt): Ter bestrijding van vogelmuur. Toepassing dient plaats begin uitstoeiende eerste spruit zichtbaar (BBCH 21) tot oktober - november of februari - maart. Toepassing dient plaats te hebben op een vochtige grond. Regenval na de toepassing komt

de werking ten goede.

Dosering: 1 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden - max. 1 toepassing/12 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking: Geen enkel deel van het gewas mag vervoederd worden.

Italiaans en Engels raigras (graszaadteelt): Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toepassing dient plaats kort na zaai (BBCH 00) of 3-4 bladeren ontvouwen (BBCH 13-14), in de herfst. Ideaal toepassen op een vochtige bodem. Regenval na de toepassing komt de werking ten goede.

Dosering: 1,5 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden - max. 1 toepassing/12 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Opmerking: Geen enkel deel van het gewas mag vervoederd worden.

Timotheegras (graszaadteelt): Ter bestrijding van éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Toepassen vanaf 3 bladeren ontvouwen - 3 spruiten zichtbaar (BBCH13-23) in het najaar of de herfst van de groei in de lente.

Dosering: 1 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden - max. 1 toepassing/12 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Opmerking: Geen enkel deel van het gewas mag vervoederd worden.

Tabak (open lucht): Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Eénmalig toepassen 3-8 dagen voor het planten.

Dosering: 2 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst met peul, open lucht): Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden. Toepassing dient plaats vanaf 2 bladeren ontvouwen (eerste bladpaar) tot 3 bladeren ontvouwen (eerste drievoudig blad) (BBCH 12-13).

Dosering: 1 l/ha, eventueel gefractioneerd. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Cichorei (open lucht): Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toepassen na opkomst van het gewas.

Dosering: 0,2 l/ha, eventueel gefractioneerd. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Spinazie (open lucht): Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Toepassen voor zaai tot voor opkomst.

Dosering: 0,8 l/ha, 1 toepassing. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Spuut op een afgehard, droog en gezond gewas. Spuit niet op een gewas dat verzakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden. Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten.

Het gebruik in de teelten van spinazie, timotheegras, tabak, stamslabonen, cichorei en rode bieten is erkend op basis van een uitbreiding aangevraagd door derden. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteits-onderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbesluiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

ANDERE VERMELDINGEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe1: Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid ethofumesaat/ha aangebracht door dit product of andere producten die ethofumesaat bevatten niet hoger zijn dan 1 kg/ha/36 maanden.

SPe2: Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie Risicoberperkende maatregelen maatregelen).

SPA1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 15.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Fytotoxiciteit is niet uit te sluiten. Raadpleeg de toelatingshouder/vergunninghouder voor informatie in verband met effecten op de opbrengst/kwaliteit.

WAARSCHUWINGEN

Om schade te voorkomen na toepassing van Oblix 500 SC als gevolg van eventuele residuen van de werkzame stof ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten van een volggewas eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Oblix 500 SC werd toegepast, kunnen de volgende gewassen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, mais, bruine bonen, tuinbonen, raigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.

Gewasschade bij volg- of vervanggewassen is niet uit te sluiten. De volg- of

vervanggewassen die geteld kunnen worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.

BEREIDEN VAN DE SPUITVLOEISTOF EN REINIGEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Spuut met grondig schoongemaakte apparatuur. Giet de helft van het benodigde water in de tank. Voeg Oblix 500 SC toe en zet het oersysteem in werking. Vul verder aan met de voorgeschreven hoeveelheid water. Laat de roerinrichting zowel tijdens het vullen van de tank als tijdens het spuiten in werking. Na gebruik de spuitapparatuur zo snel mogelijk grondig reinigen. Het spuittoestel niet reinigen in de nabijheid van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte.

EERSTE HULPMAATREGELEN

Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245**

VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie open- volgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproei tank gegoten worden. De lege verpakking onbruikbaar maken en laten vernietigen via het erkend opphaalsysteem (AgriRecover). Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspillen op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel.

NOTA

Voor schade voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Oblix 500 SC est un type herbicide de pré- et post-émergence pour le contrôle des graminées et dicotylées annuelles, souvent en combinaison avec d'autres produits agréés pour ces usages.

Généralités

Oblix 500 SC peut être appliqué pour combattre diverses mauvaises herbes annuelles, graminées et dicotylées. Oblix 500 SC est un herbicide du sol à action systémique via les parties souterraines des mauvaises herbes.

Les meilleurs résultats sont dès lors obtenus lors d'une application sur un sol humide. De la pluie après l'application améliore l'activité. Oblix 500 SC possède également une légère action de contact surtout en combinaison avec d'autres produits.

Appliquer maximum 1 kg d'éthofumésate en tant que substance active par hectare par 36 mois.

Applications

Betteraves sucrières, fourragères et rouges du pré-semis à l'émergence (plein air):

Contre le vulpin des champs, le jouet du vent, le mouron des oiseaux, les graminées annuelles, le pâturin annuel et les repousses de céréales. Le produit sera appliqué de préférence en pré-semis et incorporé au sol, surtout en cas de sécheresse.

Dosage: 2 l/ha, éventuellement fractionné. max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Betteraves sucrières, fourragères et rouges du stade cotylédons dépliés horizontalement, la première feuille est visible (de la taille d'une tête d'épingle) - 8 feuilles dépliées (BBCH 10-18) (plein air):

Contre les mauvaises herbes graminées et dicotylées annuelles comme le gaillet gratteron, le mouron des oiseaux, la mercuriale annuelle et les renouées. Appliquer le produit en fractionnement de préférence en combinaison avec des herbicides agréés pour cet usage dans 200-400 litres d'eau par hectare. Au total, appliquer maximum 0,8 l/ha d'Oblix 500 SC en application post émergence. L'application peut être réalisée de manières différentes:

Dosage: 0,4-0,8 l/ha, éventuellement fractionné. max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois.

a. A partir du stade cotylédons des betteraves, peu après l'émergence des adventices: 0,2 l/ha Oblix 500 SC + 0,5 l/ha phénémiphame (160 g/l) + 0,5 l/ha métamitron (700g/l). Il est également possible d'ajouter 0,5 l/ha d'une huile agréée.

Répéter l'application si de nouvelles mauvaises herbes apparaissent. Dans le cas où les mauvaises herbes ont 1-2 vraies feuilles ou si des mauvaises herbes moins sensibles apparaissent les doses précitées peuvent être doublées.

b. A partir du stade 2-feuilles des betteraves: 0,6 l/ha Oblix 500 SC + 3 l/ha phénémiphame (160 g/l). Cette combinaison est conseillée surtout contre les renouées et le gaillet gratteron.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Ray-grass anglais et italien (production de semences): Pour lutter contre le mouron des oiseaux.

Appliquer au stade début tallage, première pousse visible (BBCH 21) jusqu'en octobre - novembre ou février - mars. L'application doit avoir lieu sur un sol humide. Une averse après l'application améliore l'activité.

Dosage: 1 l/ha, 1 application. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois. Max. 1 application/12 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque: Aucune partie de la plante peut être consommé par le bétail.

Ray-grass anglais et italien (production de semences): Pour lutter contre les graminées et dicotylées annuelles.

Appliquer juste après le semis (BBCH 00) ou en automne au stade 3-4 feuilles étalées (BBCH 13-14). L'application doit avoir lieu sur un sol humide. Une averse après l'application améliore l'activité.

Dosage: 1,5 l/ha, 1 application. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois. Max. 1 application/12 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Remarque: Aucune partie de la plante peut être consommé par le bétail.

Fléole des prés/timothee (production de semences): Pour lutter contre les adventices graminées et dicotylées annuelles.

Appliquer du stade 3 feuilles dépliées - 3 germes visibles (BBCH 12-23) jusqu'en automne ou à la reprise de la croissance au printemps

Dosage: 1 l/ha, 1 application. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois. Max. 1 application/12 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Remarque: Aucune partie de la plante peut être consommé par le bétail.

Tabac (plein air): Pour lutter contre les dicotylées annuelles.

Appliquer une seule fois 3-8 jours avant la plantation.

Dosage: 2 l/ha, 1 application. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Haricot vert (haricot princesse, haricot vert) (récolté frais, avec cosses) (plein air): Pour lutter contre les adventices graminées et dicotylées annuelles.

Appliquer du stade 2 feuilles étalées (une paire de feuilles est étalée) au stade 3 feuilles étalées (première feuille trifoliée) (BBCH 12-13).

Dosage: 1 l/ha, éventuellement fractionné. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Chicorée (plein air): Pour lutter contre les dicotylées annuelles. Appliquer post-émergence.

Dosage: 0,2 l/ha, éventuellement fractionné. Max. 1 kg d'éthofumésate/ha/36 mois.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Épinard (plein air) : Pour lutter contre les dicotylées annuelles.

Appliquer du pré-semis à l'urgence.

Dosage: 0,8 l/ha, 1 application.

Mesure de réduction du risque: Zone tampon minimale de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer le produit sur une végétation endurecie, sèche et saine. Ne pas appliquer sur une végétation qui est affaiblie par des insectes, des dégâts de pulvérisation, du gel nocturne ou des herbicides. Ne pas appliquer le produit en cas de conditions extrêmement ensoleillées, dans ce cas appliquer de préférence le soir.

L'utilisation du produit dans les cultures d'épinard, de fléole des prés, de haricot vert, de tabac, de chicorée et de betterave rouge est autorisée sur base d'une demande d'élargissement faite par des tiers. Pour cet élargissement aucune recherche d'efficacité et de phytotoxicité du produit n'a été faite. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire un essai de pulvérisation avant l'usage extensif. Le risque de l'utilisation de ce produit dans ces cultures revient à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

AUTRES MENTIONS

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente. SPO: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe1: Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale d'éthofumésate/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant de l'éthofumésate ne peut pas dépasser 1 kg/ha/36 mois.

SPe2: Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 15.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

La phytotoxicité ne peut être exclue. Consulter le titulaire de l'autorisation/ de la licence pour des informations concernant les effets sur le rendement/ la qualité.

AVERTISSEMENTS

Afin d'éviter tout dommage après l'application d'Oblix 500 SC dû aux éventuels résidus de la substance active éthofumésate dans le sol, le semis ou la plantation des cultures subséquentes doivent être précédés d'un labour, par exemple dans le cas de céréales d'hiver ou lors d'un échec de culture. En

cas d'échec de culture où Oblix 500 SC a été appliqué, les cultures suivantes peuvent être semées ou plantées: betteraves sucrières et fourragères, maïs, haricots bruns, fèves, ray-grass, pois, épinards, céleris-raves, carottes, oignons à semer ou à planter.

Des dommages aux cultures suivantes ou de remplacement ne peuvent pas être exclus. Les cultures suivantes ou de remplacement qui peuvent être cultivées sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation.

MELANGER LE SPRAY ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

Pulvériser avec un appareillage soigneusement rincé. Verser la moitié de l'eau nécessaire dans le réservoir. Ajoutez Oblix 500 SC et enclenchez le mélangeur. Complétez en ajoutant le reste du volume d'eau prescrit. Laissez fonctionner le mélangeur, tant pendant le remplissage que pendant la pulvérisation. Rincer et nettoyer soigneusement le pulvérisateur après l'utilisation. Ne pas nettoyer le pulvérisateur à proximité des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux des cours de fermes ou des routes. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité nécessaire en fonction de la superficie à traiter.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

DESTRUCTIONS DES EMBALLAGES ET DES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. Rendre l'emballage inutilisable et le faire détruire par l'intermédiaire de l'organisme de collecte d'emballage phyto agréé (AgriRecover). Diluer le surplus de traitement au moins 10 fois et appliquer sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

NOTE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.

OBLIX® 500 SC

TOELATINGSNUMMER

8139P/B

NUMÉRO D'AUTORISATION

WERKZAME STOF

ETHOFUMESAAT / ÉTHOFUMÉSATE

MATIÈRE ACTIVE

GEHALTE

500 G/L

TENEUR

FORMULERINGSTYPE

SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) /
SUSPENSION CONCENTRÉ (SC)

TYPE DE FORMULATION

ANTIGIFCENTRUM

070/245.245

CENTRE ANTIPOISONS

BEVAT

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on/
1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one

CONTIENT

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage
professionnel.

Waarschuwing/Attention

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige
gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermende handschoenen,
beschermende kleding en
gelaatsbescherming dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation:

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
CLAUDIUS PRINSENLAAN 144A, BLOK A
4818 CP BREDA, NEDERLAND

Verdeeld door/ distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, Block A,
4818 CP, Breda, The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300



MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H410 Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 Porter des gants de protection,
des vêtements de protection et un
équipement du visage.

P391 Recueillir le produit répandu.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-
3(2H)-one. Peut produire une réaction
allergique.

EUH401 Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour
la santé humaine et l'environnement.

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking

NUMERO DE LOT: Voir emballage

PRODUCTIEDATUM: Zie op de verpakking

DATE DE FABRICATION: Voir sur l'emballage

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK/

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

VORSTVRIJ BEWAREN/CONSERVER À L'ABRI DU GEL.



Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 15 HERBICIDE

5L
INHOUD / CONTENU

® Gedeponeerd handelsmerk van/ Marque
déposée de: UPL Holdings Coöperatief U.A