

PROXANIL®

FUNGICIDE/ FONGICIDE

FUNGICIDE ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans) FONGICIDE pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans)

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/l (36,9% w/w) propamocarb en 50 g/l (4,6% w/w) cymoxanil
Suspension concentrée (SC) contenant 400 g/l (36,9% p/p) de propamocarb et 50 g/l (4,6% p/p) de cymoxanil

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: 9565P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée

Verdeeld door / Distribué par:

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a,
4818 CP Breda, The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

Lotnummer en productiedatum / Numéro de lot et date de production:

zie verpakking / voir emballageErkend

© Gedeponoerd handelsmerk van / Marque déposée de:
Arysta LifeScience Benelux Sprl

WAARSCHUWING/ATTENTION

Gevenaanduidingen:

- H290** Kan bijten zijn voor metalen.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

UFI : QYME-U49R-ESKX-CF1Q



Veiligheidsaanbevelingen:

- P234** Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie:

- EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP0 Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)
SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 28.

Mentions d'avertissement:

- H290** Peut être corrosif pour les métaux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

- P234** Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation
P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

- P390** Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles:

- EUH401** Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
SP0 Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les code FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 et 28.



Antigifcentrum / Centre Antipoisons : +32 (0)70/245.245

10 L
INHOUD/CONTENU



BE 2200159 03 0423

BE 6200048



GEbruik, Gebruiksdosissen en Bijzondere Toepassingsvoorwaarden

Proxanil is een fungicide op basis van propamocarb (lokaal systemisch fungicide met acropetaal transport naar de groeipunt) en cymoxanil (translaminair en retroactief fungicide). Beide werkzame stoffen hebben een verschillende, maar complementaire werking op de aardappelziekte (Phytophthora infestans). Om de aardappelziekte efficiënt te bestrijden, moet men het aardappelgewas preventief behandelen volgens het advies van de waarschuwingdienst of zeker voor het verschijnen van de 1^e symptomen van de aardappelziekte in de regio. De toepassing van de 1^e behandeling hangt af van de gewasstand en de aanwezige ziektedruk. In het algemeen gebeurt de 1^e behandeling voor het sluiten van de rijen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ziektedruk, kan men overwegen om de 1^e behandeling vroeger toe te passen. De frequentie van de volgende behandelingen gebeurt in functie van de weersverwachtingen of volgens het advies van de waarschuwingdienst.

Aardappelen (open lucht)

Dosis: 2,5 l/ha, 1-6 toepassingen, preventief of bij de eerste tekenen van besmetting. Max. 6 toepassingen per seizoen met een interval van 7 dagen.

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

Aardappelpootgoedteelt

Dosis: 2 l/ha, 1-6 toepassingen, preventief of bij de eerste tekenen van besmetting. Max. 6 toepassingen per seizoen met een interval van 7 dagen.

Driftreducerende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

EErSTEHULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEn: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Opmerkingen

- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.
- Om overschrijding van de MRL te voorkomen, moet een tijdsduur van minstens 30 dagen worden genomen tussen de laatste behandeling en het zaaien of planten van gewassen waarvoor de werkzame stof propamocarb in België niet is toegelaten.
- Draga altijd beschermende basiskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermende kleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en waterdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelingspunt. Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te verwijderen, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoelstof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruiksdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.

USAGE, DOSE D'EMPLOI ET CONDITIONS D'APPLICATIONS PARTICULIERES

Proxanil est un fongicide à base de propamocarb (fongicide carbamate systémique) et de cymoxanil (fongicide de contact et à activité systémique localisée). Les deux matières actives ont une action différente et complémentaire sur le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans). Pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre, la pulvérisation préventive du feuillage des pommes de terre doit être effectuée suivant les avertissements et au plus tard lors de l'apparition des premiers symptômes. L'application de la première pulvérisation dépend du développement de la culture et de l'ampleur des précipitations. En général, commencer le traitement dès que les plants se touchent. On peut considérer de faire la 1^{ère} application plus tôt en fonction des circonstances climatiques et la pression de maladie. Selon les circonstances climatologiques, répéter le traitement.

Pommes de terre (plein air)

Dose: 2,5 l/ha, 1-6 applications, préventivement ou aux premiers signes d'infestation. Max. 6 applications par saison avec un intervalle de 7 jours.

Délai avant la récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Culture de plants de pommes de terre

Dose: 2 l/ha, 1-6 applications, préventivement ou aux premiers signes d'infestation. Max. 6 applications par saison avec un intervalle de 7 jours.

Mesures de réduction du risque: zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOLISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOLISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipolisons 070/245.245

Remarques

- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.
- Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 30 jours doit être respecté entre le dernier traitement et le semis ou la plantation des cultures pour lesquelles la substance active propamocarb n'est pas autorisée en Belgique.
- Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux utilisations décrites. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux dommages qui surviendraient suite à la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles variétés etc., veuillez nous contacter par avance afin d'obtenir de plus amples informations.



PROXANIL®

FUNGICIDE/ FONGICIDE

FUNGICIDE ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans) FONGICIDE pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans)

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/l (36,9% w/w) propamocarb en 50 g/l (4,6% w/w) cymoxanil
Suspension concentrée (SC) contenant 400 g/l (36,9% p/p) de propamocarb et 50 g/l (4,6% p/p) de cymoxanil

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: 9565P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik
Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée

Verdeeld door / Distribué par:
UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a,
4818 CP Breda, The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

Lotnummer en productiedatum / Numéro de lot et date de production:
zie verpakking / voir emballage
Erkend

® Gedeponoerd handelsmerk van / Marque déposée de:
Arysta LifeScience Benelux Sprl

WAARSCHUWING/ATTENTION

UFI : QYME-U49R-ESKX-CF1Q



Gevarenaanduidingen:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SpO Na de behandeling de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SpE3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)
SpA1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 27 en 28.

Mentions d'avertissement:

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation
P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P391 Recueillir le produit répandu.

Informations additionnelles:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
SpO Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SpE3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
SpA1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les code FRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 27 et 28.



Antigifcentrum / Centre Antipoisons : +32 (0)70/245.245

10 L
INHOUD/CONTENU



