



PYRUS[®] 400 SC

FUNGICIDE/FONGICIDE

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/l (37,41% w/w) pyrimethanil
Suspension concentrée (SC) contenant 400 g/l (37,41% p/p) de pyriméthanil

Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : 9380P/B
Numéro d'agrément (LUX) : L01618-062

Lotnummer en productiedatum : zie verpakking
Numéro de lot et date de production : voir emballage

Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken./Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

Erkenningshouder/Détenteur de l'agrément :

Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée (Belgique)

Verdeeld door/Distribué par :

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

INHOUD/CONTENU : 5L
400 G/L PYRIMETHANIL/ PYRIMÉTHANIL

* Gedeponiseerd handelsmerk van / Marque déposée de: Arysta LifeScience Benelux Sprl.

2203923 ELI. 2022-09 v01

FUNGICIDE TEGEN BOTRYTIS IN AARDBEIEN, TOMATEN, BRAAMSTRIUKEN, FRAMBOZENSTRIUKEN, AUBERGINE, PEPINO, DRUIVELAARS EN SIERPLANTEN. TEGEN SCHURFT IN APPEL-EN PERENBOMEN, SIERBOMEN EN -HEESTERS.

Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken.

PYRUS 400 SC is een preventief en curatief fungicide voor tomaten- en aardbeienteelt, braamstruiken, frambozenstruiken, sierplanten, druivelaars, aubergine/ierplant, pepino (tegen *Botrytis* spp.), appel- en perenbomen, sierbomen en -heesters (tegen schurft). Het product verplaatst zich translaminair in het blad en verzekert aldus een zeer goede bescherming van de bespoten plantendelen.

1. AARDBEIEN

- In open lucht

Toepassingsstadium: strekking bloeiwijze - einde van de bloei (BBCH 56-67) 1-2 toepassingen ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*) van de vruchten aan een dosis van 2l/ha. Behandeling afhankelijk van de infectiedruk om de 7-10 dagen. In regenvrije periode PYRUS 400 SC steeds na de regen zetten om maximaal van de curatieve werking gebruik te maken. Volg steeds de technische richtlijnen in uw streek.

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Driftreducerende maatregelen: Respecteer een bufferzone van 5m met klassieke techniek.

Lees ook de opmerkingen.

- Onder bescherming

Toepassingsstadium: strekking bloeiwijze - einde van de bloei (BBCH 56-67) 1-2 toepassingen ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*) van de vruchten aan een dosis van 2l/ha. Behandeling afhankelijk van de infectiedruk om de 7-10 dagen.

Veiligheidstermijn: 3 dagen Lees ook de opmerkingen.

2. TOMATEN (onder bescherming), AUBERGINE/ EIERPLANT EN PEPINO (open lucht en onder bescherming)

Ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*) aan een dosis van 0,8 l/ha haag, 1-2 toepassingen, plaatselijke behandeling. PYRUS 400 SC inzetten onmiddellijk na de pluk (maximum 1 dag nadien). PYRUS 400 SC niet toepassen over het gehele gewas om negatieve effecten op *Encarsia formosa* te vermijden.

Op jonge planten en bij hoge relatieve vochtigheid (>80%) werd voorbijgaande fytotoxiciteit genoteerd na de bespuiting (bruine stipjes) op de jongste bladeren. Gebruik PYRUS 400 SC enkel indien voldoende ervaring is opgedaan en bij afgeharde planten (lage luchtvochtigheid en niet te hoge temperatuur: <30°C). Na de bespuiting verlichten en eventueel droog stoken. Na de toepassing wachten tot het gewas volledig opgedroogd is alvorens het behandelde compartiment te betreden.

Veiligheidstermijn: 1 dag

Driftreducerende maatregelen (aubergine/ierplant en pepino, open

lucht): bufferzone van 5m met klassieke techniek.

Lees ook de opmerkingen.

3. BRAAMSTRIUKEN EN FRAMBOZENSTRIUKEN IN OPEN LUCHT

Toepassingsstadium: bloemknop - einde van de bloei (BBCH 56-69)

Ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*) aan een dosis van 2 l/ha haag (0,02l/100m haaglengte), 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen).

Veiligheidstermijn: 7 dagen.

Driftreducerende maatregelen: Respecteer een bufferzone van 10m met klassieke techniek.

Lees ook de opmerkingen.

4. SIERPLANTEN (niet bestemd voor consumptie) (open lucht en onder bescherming)

(Kalanchoë, Ficus, Begonia, Impatiens, rozen, chrysanten, Azalea, Lonicera, Vinca, Viburnum, Thuja) Toepassingsstadium: 1ste blad - bladval (BBCH 11-93). Ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*) vanaf het verschijnen van de symptomen aan een dosis van 0,2 l/100 l water met 1-3 toepassingen om de 7 dagen.

Driftreducerende maatregelen (open lucht): Respecteer een bufferzone van 5m met klassieke techniek.

Lees ook de opmerkingen

5. SIERBOMEN EN -HEESTERS (niet bestemd voor consumptie) (open lucht en onder bescherming)

Toepassingsstadium: groene knop - einde van de bloei (BBCH 56-69) Ter bestrijding van schurft (*Venturia*, *Spilocaea*), 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen aan een dosis van 0,075l/100l.

Driftreducerende maatregelen (open lucht): Respecteer een bufferzone van 10m met klassieke techniek.

Lees ook de opmerkingen.

6. DRUIVELAARS (voor wijnproductie) (open lucht) Toepassingsstadium: einde van de bloei - rijping (BBCH 69-85)

Ter bestrijding van grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*); 0,8 l/ha haag.

Maximum 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 21 dagen

Driftreducerende maatregelen: bufferzone van 5m met klassieke techniek

7. APPEL- EN PERENBOMEN (OPEN LUCHT) Toepassingsstadium: ontwikkeling van de bladeren - bloei (BBCH 10-69)

Ter bestrijding van schurft (*Venturia inaequalis* / *Venturia pirina*), 1-3 toepassingen met een interval van 7 dagen aan een dosis van 0,66 l/ha haag (1 l/ha standaardboomgaard).

Veiligheidstermijn: 56 dagen.

Driftreducerende maatregelen: bufferzone van 20 m met klassieke techniek.

OPMERKINGEN

- Om een goede bescherming te behouden en om de ontwikkeling van minder gevoelige stammen te vermijden of te verminderen, raden wij PYRUS 400 SC aan in een bespuitingsprogramma in afwisseling met andere erkende producten ter bestrijding van *Botrytis* en/of

andere ziekten.

- PYRUS 400 SC heeft geen onaanvaardbare effecten op hommels noch op nuttige roofmijten zoals de appelroofmijt *Typhlodromus pyri*, *Orius laevigatus*.

- De bespuitingen uitvoeren op een opgedroogd gewas. Na de toepassing wachten tot het gewas volledig opgedroogd is alvorens het perceel, de serre of plastic kap te betreden.

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

- Omwille van wisselende teeltvoorwaarden bij vele verschillende soorten en variëteiten van sierplanten, kunnen wij geen algemeen bindende uitspraak doen over de selectiviteit van het product. Wij raden daarom aan om op enkele planten een tolerantietest uit te voeren in elk gewasstadium en bij diverse teeltvoorwaarden; indien het resultaat voldoet, dan pas kan de hele teelt behandeld worden. Het toepassingsrisico ligt bij de gebruiker, aansprakelijkheid van de erkenningshouder is uitgesloten.

- De code voor de werkwijze van pyrimethanil is 9.

- Een ha standaardboomgaard is een boomgaard van een ha grondoppervlakte, beplant met bomen in productie (behalve op de rijuiteinden, de zgn. wendakkers) van 3 m hoog in enkele rijen op een onderlinge afstand van 3,5 m die aan beide zijden worden bespoten.

Aanwijzingen betreffende de eerste hulp Algemeen: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. **Contacteer het Antigifcentrum (TEL +32 (0)70/245.245) voor verdere behandeling in het hospitaal.**

Vernietiging van lege verpakkingen en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van te behandelende oppervlakte en van het debiet per hectare.

Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Daar zijn doeltreffendheid kan afhangen van de interactie van diverse factoren (grond, weer, variëteit, enz.), waarvan het effect onvoorzienbaar is, wijzen wij van te voren alle verantwoordelijkheid af voor een minder goede werking of schade.

FONGICIDE ANTI-BOTRYTIS SUR FRAISIERS, TOMATES, RONCES (MURES), FRAMBOISIERS, AUBERGINES, PEPINOS, VIGNES ET PLANTES ORNEMENTALES.

FONGICIDE ANTI-TAVELURE SUR POMMIERS, POIRIERS, ARBRES ET ARBUSTES ORNE- MENTAUX.

Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

PYRUS 400 SC est un fongicide à action préventive et curative pouvant être utilisé sur tomates, fraises, ronces (mûres), framboisiers, plantes ornementales, vignes, aubergines et pépinos contre le Botrytis et contre la tavelure sur pommiers, poiriers, arbres et arbustes orne- mentaux. Il est absorbé et transporté de façon translaminaire, ce qui donne une excellente protection de toute la surface foliaire traitée.

1. FRAISIERS

- En plein air

Stade d'application: élongation inflorescence - fin de la floraison (BBCH 56-67) 1 à 2 applications contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) des fruits à une dose de 2l/ha. Traiter tous les 7 à 10 jours en fonction de la pression parasitaire.

En période pluvieuse, positionner le PYRUS 400 SC après cette période afin de profiter au maximum de sa capacité curative.

Toujours bien suivre les renseignements techniques de votre région.

Délai avant récolte: 3 jours

Mesures anti-dérive: Respecter une zone tampon de 5m avec technique classique.

Lisez également les remarques ci-dessous.

- sous protection

Stade d'application: élongation inflorescence - fin de la floraison (BBCH 56-67)

1 à 2 applications contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) des fruits à une dose de 2l/ha. Traiter tous les 7 à 10 jours en fonction de la pression parasitaire.

Délai avant récolte: 3 jours

Lisez également les remarques ci-dessous.

2. TOMATES (sous protection), AUBERGINES ET PEPINOS (plein air et sous protection)

(Pépinos uniquement agréé en Belgique) Contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) à la dose de 0,8 l/ha de haie, 1 à 2 applications en traitement localisé. Utiliser PYRUS 400 SC de suite après la cueillette de feuilles et fruits, au maximum un jour plus tard. Ne pas traiter sur la totalité de la culture afin d'éviter tout problème

avec les populations d'*Encarsia formosa* présentes dans la culture.

Une phytotoxicité passagère (petites taches brunâtres) a été observée sur les plantes jeunes et par humidité relativement élevée (>80%).

N'utiliser le PYRUS 400 SC qu'en cas d'expérience suffisante avec le produit et sur des plantes endurcies (HR <80%, T trop élevées: <30°C).

Aérer les compartiments de la serre après l'utilisation, éventuellement les chauffer. Après l'application, ne pas entrer dans le compartiment traité avant que la culture ne soit complètement séchée.

Alterner le PYRUS 400 SC avec d'autres fongicides agréés (avec mode d'action différent).

Délai avant récolte: 1 jour

Mesures anti-dérive (aubergines et pépinos, plein air): Respecter une zone tampon de 5m avec technique classique.

Lisez également les remarques ci-dessous.

3. RONCES (MURES) ET FRAMBOISIERS EN PLEIN AIR

Stade d'application: boutons floraux - fin de la floraison (BBCH 56-69)

Contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1 à 2 applications à la dose de 2 l/ha de haie

(0,02l/100m de longueur de haie); un intervalle de 7 à 10 jours est nécessaire entre les deux applications.

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures anti-dérive: Respecter une zone tampon de 10m avec technique classique.

Lisez également les remarques ci-dessous.

4. PLANTES ORNEMENTALES (non destinées à la consommation) (plein air et sous protection)

(Kalanchoe, Ficus, Begonia, Impatiens, roses, chrysanthème, azalées, Lonicera, Vinca, Viburnum, Thuja).

Stade d'application: 1ère feuille - chute des feuilles (BBCH 11-93)

Dès l'apparition des symptômes de la pourriture grise (*Botrytis cinerea*): 1 à 3 applications espacées de 7 jours à la dose de 0,2 l/100 L d'eau.

Mesures anti-dérive (plein air): Respecter une zone tampon de 5m avec technique classique. Lisez également les remarques ci-dessous.

5. ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX (non destinés à la consommation) (plein air et sous protection)

Stade d'application: bouton vert - fin de la floraison (BBCH 56-69)

Contre la tavelure (*Venturia, Sphloeaeae*), 1 à 3 applications à intervalle de 7-10 jours à la dose de 0,075l/100l.

Mesures anti-dérive (plein air): Respecter une zone tampon de 10m avec technique classique.

Lisez également les remarques ci-dessous.

6. VIGNE (pour production de vin) (plein air) Stade d'application: fin floraison - véraison (BBCH 69-85)

Contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*), appliquer 0,8l/ha de haie. Maximum 1 application.

Délai avant récolte: 21 jours

Mesures anti-dérive: respecter une zone tampon de 5m avec technique classique.

7. POMMIERS ET POIRIERS (PLEIN AIR) Stade d'application: développement des feuilles - floraison (BBCH 10-69)

Contre la tavelure du pommier / poirier (*Venturia inaequalis* / *Venturia pirina*), max. 3 applications avec un intervalle de 7 jours à la dose de 0,66 l/ha de haie (1 l/ha de verger standard).

Délai avant récolte: 56 jours.

Mesures anti-dérive: zone tampon de 20 m avec technique classique.

8. RAISIN DE CUVE (LUX)

Stade d'application: dès le début des avertissements. Max. 2 applications de ce produit ou d'un autre produit contenant la même substance active, toutes les 3 semaines. Contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) à la dose de 0,625 à 2,5 l/ha. Délai avant récolte: 21 jours. Mesures anti-dérive: respectez une zone tampon de 10m entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau.

9. CULTURE ORNEMENTALES SOUS VERRE (LUX) Stade d'application: à partir du stade 1ère feuille jusqu'au stade dernière feuille. Contre la pourriture grise (*Botrytis cinerea*), 1-3 applications avec un intervalle de 7 jours à la dose de 0,2 l/100l.

REMARQUES

- Pour maintenir un bon niveau de protection et pour éviter ou limiter le développement des souches moins sensibles à ce produit, nous recommandons d'inscrire le PYRUS 400 SC dans un programme de traitements en alternance avec d'autres fongicides agréés contre la pourriture grise et d'autres maladies.

- Traiter sur une végétation sèche. Après l'application, ne pas entrer dans la parcelle ou cet abri avant que la culture ne soit pas complètement séchée.

- PYRUS 400 SC n'a pas d'effet inacceptable sur les bourdons ni sur les acariens prédateurs comme *Typhlodromus pyri* et *Orius laevigatus*.

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

- Du fait des conditions variables de culture pour de nombreuses sortes et variétés différentes de plantes ornementales, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon générale et contractuelle au sujet de la sélectivité du produit. Nous conseillons d'effectuer pour cette raison un test de tolérance sur quelques plantes dans chaque étape de croissance et sous diverses conditions de culture; si le résultat est satisfaisant, alors seulement la culture entière pourra être traitée. L'application se fait au risque de l'utilisateur, toute responsabilité du détenteur d'homologation est exclue.

- Le code pour le mode d'action du pyriméthanile est 9.

- Un ha de verger standard est un verger d'un ha de surface au sol, planté d'arbres en production (sauf aux extrémités, ce que l'on appelle les chaintres) de 3 m de haut en lignes simples avec une distance intermédiaire de 3,5 m.

- Le produit n'est pas toxique pour les abeilles (LUX).

- Le produit est toxique pour les organismes aquatiques (LUX).

- Le produit est toxique pour les algues (LUX).

- Le produit est toxique pour les poissons et leurs proies (LUX).

- Le produit peut être utilisé en lutte intégrée en cultures fruitières (LUX).

- Le produit peut être utilisé en lutte intégrée en viticulture (LUX).

Indications concernant les premiers secours Général: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas d'ingestion: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPPOISONS ou un médecin en cas de malaise. En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique. **Contacter le Centre Antipoisons (TEL +32 (0)70/245.245 (BE), (+352) 8002-5500 (LUX)) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.**

Emballage vide et surplus de traitement L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation.

L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Comme son efficacité peut dépendre de l'interaction de facteurs dont les effets ne sont pas toujours prévisibles (sol, météorologie, variété, etc.). Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour une efficacité moindre ou pour des dégâts.



PYRUS[®] 400 SC

FUNGICIDE/FONGICIDE

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/l (37,41% w/w) pyrimethanil
Suspension concentrée (SC) contenant 400 g/l (37,41% p/p) de pyriméthanil

Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : 9380P/B
Numéro d'agrément (LUX) : L01618-062

Lotnummer en productiedatum : zie verpakking
Numéro de lot et date de production : voir emballage

Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken./Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.

Erkenningshouder/Détenteur de l'agrément :

Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée (Belgique)

Verdeeld door/Distribué par :

UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a
4818 CP Breda
The Netherlands
Tel. +31 (0)85 0712300

INHOUD/CONTENU : 5L
400 G/L PYRIMETHANIL/ PYRIMÉTHANIL

* Gedeponeerd handelsmerk van / Marque déposée de: Arysta LifeScience Benelux Sprl.

