

ROYAL MH

TOEPASSING IN ZAAIUIEN, ZILVERUIEN, PICKLERS, 2^E JAARS PLANTUIEN, ZAAI- EN PLANTSJALOTTEN EN KNOFLOOK

Voor het tegengaan van spruitvorming bij zaaiuien, zilveruien, picklers, 2^e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook dient ROYAL MH met een gewasbehandeling in het veld te worden toegepast aan het einde van de groeiperiode. Het meest geschikte tijdstip van toepassing is als het loof begint te strijken (vuistregel: 10% gestreken). Na de toediening is voor een goede opname nog 2 weken lang een groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Doordat het loof het middel moet opnemen, dient het na bespuiting minimaal 10 uur droog te blijven.

Na behandeling kan de bewaarperiode zonder bezwaar met 1 à 2 maanden worden verlengd.



Dosering

3,75 kg per hectare toepassen in tenminste 500 liter water + 0,15 liter uitvloeier.

Compatibiliteit

ROYAL MH niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.

Algemene aspecten

Uitsluitend toepassen op een gezond en goed groeiend gewas. Toepassen op zaaiuien is alleen zinvol wanneer tot in het voorjaar wordt bewaard. Bewaar de uien niet afgestaart, ondanks de behandeling. Na de bespuiting de spuittank en het spuitmateriaal grondig schoonmaken.



Wettelijk Gebruiksvoorschrift W3

TOEPASSINGSGEBIED	DOEL GROEIREGULATIE	DOSERING (middel) PER TOEPASSING	MAXIMAAL AAN- TAL TOEPASSINGEN per teeltcyclus	VEILIGHEIDS- TERMIJN IN DAGEN
CONSUMPTIE AARDAPPELEN	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaarperiode en tegengaan van aardappelopslag in het volgewas	5 kg/ha	1	21
ZETMEELAARDAPPEL				
UIEN (m.u.v. eerstejaars plantui)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	3,75 kg/ha ¹	1	14
SJALOTTEN				
KNOFLOOK				

¹ Toepassen met een uitvloeier

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt consumptieaardappel en zetmeelaardappel 350 tot 500 liter water per hectare toepassen, in de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, 2^e jaars plantuien, zaai- en plantsjalotten en knoflook 500 tot 800 liter water per hectare toepassen.



UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A, 4818 CP Breda, Nederland
T: 31 (0)85-0712300 - **E:** uplbenelux.info@upl-ltd.com - **W:** www.upl-ltd.com/nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

NL052024

ROYAL MH[®]

DE BASIS VOOR KIEMREMMING IN AARDAPPELEN EN UIEN.



G R O E I R E G U L A T O R

FUNDAMENT VOOR KIEM-REMMING

De voordelen van ROYAL MH in aardappelen en uien

- Een stevige basis voor een goede kiemremming en rust in de bewaring
- Voorkomt gewichts- en kwaliteitsverlies
- Gemakkelijk in gebruik
- Uitstekende korrelformulering met een goede oplosbaarheid
- Geconcentreerd product, waardoor slechts een kleine hoeveelheid per hectare nodig is

Extra voordelen in aardappelen

- Vermindert sterk het risico op inwendige kieming
- Behoud van de schilkwiteit
- Vermindert aardappelopslag in het volgewas
- Nevenwerking op doorwas

Meer informatie op:
www.upl-ltd.com/nl




ROYAL MH

ROYAL MH zorgt voor een langdurige kiem- en spruitremming van aardappelen en uien tijdens de bewaarperiode. ROYAL MH is een product op basis van de actieve stof maleinehydrazide (600 g/kg). ROYAL MH wordt systemisch opgenomen en bij het bereiken van de knollen van de aardappel en de bolstoel van de uiachtigen stopt de celdeling. Celgroei en- strekking gaat wel door, waardoor de opbrengst zich normaal blijft ontwikkelen. Het moment van toepassen is hierbij belangrijk.

TOEPASSING IN CONSUMPTIE- EN ZETMEELAARDAPPELEN

(Algemeen advies) – vele factoren voor goede opname in de knol



Eenmalig een gewasbehandeling in het veld uitvoeren voor het tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en het tegengaan van aardappelopslag in het volggewas.

Kiemremming

De werkingsduur is afhankelijk van het ras, jaar van toepassing en de bewaaromstandigheden. Een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel is in veel gevallen noodzakelijk, maar kan soms ook achterwege blijven. Dit is afhankelijk van het ras, de bewaaromstandigheden en uiteraard het moment van afleveren. Inspecteer daarom met regelmaat de aardappelen in de bewaring op kieming. In de gevallen waar een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel nodig is de behandeling

met ROYAL MH nog steeds van toegevoegde waarde. Onderzoek heeft laten zien dat knollen behandeld met MH ook uiteindelijk zullen gaan kiemen, maar dat deze kiemen minder doorgroeien. Dit komt dan ook terug het kiemgewicht, wat gemiddeld genomen lager is bij MH behandeld aardappelen.

Vermindering aardappelopslag

Toepassing van ROYAL MH leidt tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Het effect is onder meer afhankelijk van het aardappelras en het jaar van toepassing. Voor een volledige bestrijding kan het soms noodzakelijk zijn om aanvullende bestrijdingsmaatregelen te treffen in het gewas volgend op de teelt van aardappelen.

Nevenwerking doorwas

Bij toepassing van ROYAL MH in aardappelen volgens het etiket (tegen kieming in de bewaring en aardappelopslag) wordt ook geprofiteerd van de nevenwerking tegen doorwas. Het gaat de secundaire groei, die vooral bij droogte en hitte kan optreden, tegen. Dit leidt tot betere ontwikkeling van de primaire knollen en minder glasaardappelen.



Links aardappelknol zonder ROYAL MH en rechts aardappelknol met ROYAL MH



ZONDER ROYAL MH



5kg/ha ROYAL MH



ZONDER ROYAL MH



5kg/ha ROYAL MH