

SACRON®

FUNGICIDE / FONGICIDE

TOELATINGSNUMMER

10731 P/B

NUMÉRO D'AUTORISATION

AARD

FUNGICIDE / FONGICIDE

NATURE

WERKZAME STOF

CYMOXANIL

MATIÈRE ACTIVE

GEHALTE

450 g/kg (45 % w/w)

TENEUR

AARD VAN HET PREPARAAT

WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT (WG) /

TYPE DE FORMULATION

GRANULES À DISPERSER DANS L'EAU (WG)

ANTIGIFCENTRUM

070/245.245

CENTRE ANTIPOISONS

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage professionnel.

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a Block A

4818 CP Breda

The Netherlands

Verdeeld door/distribué par:

UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144A


4818 CP Breda

(+31)850712300

www.upl-ltd.com/nl



www.agrirecover.eu



8 717185 526134

INHOUD/CONTENU:

1 KG



UPL

BE-2914152-01-1124

WAARSCHUWING/ ATTENTION



GEVARENAANDUIDINGEN

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 - Kan schade aan het bloedstelsel, de thymus en de ogen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P280 - Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.

P301+P330+P311 - NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een art raadplegen.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 - Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour le système sanguin, le thymus et les yeux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263 - Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.

P280 - Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P301+P330+P311 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche et appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

P391 - Recueillir le produit répandu.

P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208 - Contient du Cymoxanil. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: 19MR-Y0M3-EVK2-8HTQ

SACRON®

FUNGICIDE / FONGICIDE

GEBRUIKSAANWIJZING

SACRON is een fungicide voor gebruik tegen Phytophthora infestans in de aardappel- en aardappelpootgoedteelt.

Algemeen

SACRON is een curatief werkende fungicide voor gebruik tegen Phytophthora infestans in de aardappelteelt. Dit middel dient steeds te worden toegepast in combinatie met een fungicide met een verschillend werkingsmechanisme.

Toepassingen

Aardappelen en aardappelpootgoedteelt (open lucht):

De curatieve werking van SACRON op Phytophthora is hoogstens tot twee dagen na infectie van de plant. Gezien de Phytophthora op dat moment nog niet waarneembaar is, is het van groot belang om dit middel als aanvulling op een preventief spuitschema, op het juiste moment toe te passen.

Dosis: 0,22 kg/ha, 1-8 toepassingen met een interval van 7-10 dagen of volgens de waarschuwingen, in menging met een fungicide met een verschillend werkingsmechanisme. Max. 8 toepassingen / 12 maanden

Veiligheidstermijn: 14 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

ANDERE VERMELDINGEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosissen kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Aanbevelingen voor de toepassing van mengsels worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning. Raadpleeg ook het etiket van het (de) partnerproduct(en).

SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product zijn 27.

Draag altijd beschermende basiskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermende kleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en waterdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

BEREIDEN VAN DE SPUITVLOEISTOF EN REINIGEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur. SACRON dient te worden toegepast met 150-400 l water/ha. Giet de helft van het benodigde water in de tank. Voeg SACRON toe en zet het roersysteem in werking. Vul verder aan met de voorgeschreven hoeveelheid water. Laat de roerrichting zowel tijdens het vullen van de tank als tijdens het

MODE D'EMPLOI

SACRON est un fongicide pour usage contre le mildiou (Phytophthora infestans) en culture de pommes de terre et de plants de pommes de terre.

Généralités

SACRON est un fongicide curatif pour usage contre le mildiou en culture de pommes de terre. Ce produit doit être utilisé en mélange avec un fongicide avec un mode d'action différent.

Applications

Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air): SACRON a un effet curatif sur les infections de Phytophthora jusqu'à deux jours après l'infection. Comme l'infection n'est pas encore visible à ce stade, il est important d'appliquer ce produit en complément à un calendrier de traitement préventif au moment nécessaire.

Dose: 0,22 kg/ha, 1-8 applications à intervalle de 7-10 jours ou selon les avertissements, en mélange avec un fongicide avec un mode d'action différent. Maximal 8 application(s) / 12 mois

Délai avant récolte: 14 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

AUTRES MENTIONS

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Les recommandations pour l'application de mélanges sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation/du permis. Consulter également l'étiquette du/des produit(s) partenaire(s).

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le FRAC pour ce mode d'action de la substance active de ce produit est 27.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

Pulvériser avec un appareillage soigneusement rincé. SACRON doit être appliqué dans 150-400 l d'eau/ha. Versez la moitié de l'eau nécessaire dans le réservoir. Ajoutez SACRON et enclenchez le mélangeur. Complétez en

spuiten in werking. Na gebruik de spuitapparatuur zo snel mogelijk grondig reinigen. Het spuittoestel niet reinigen in de nabijheid van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte.

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor de behandeling na ziekenhuisopname.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

VERNIEETING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervullen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

ajoutant le reste du volume d'eau prescrit. Laissez fonctionner le mélangeur, tant pendant le remplissage que pendant la pulvérisation. Rincer et nettoyer soigneusement le pulvérisateur après l'utilisation. Ne pas nettoyer le pulvérisateur à proximité des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux des cours de fermes ou des routes.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforce de calculer au mieux la quantité nécessaire en fonction de la superficie à traiter.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contactez le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons 070/245.245

DESTRUCTIONS DES EMBALLAGES ET DES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vidé. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

NOTE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.

WAARSCHUWING/ ATTENTION



GEVARENAANDUIDINGEN

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H361fd - Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 - Kan schade aan het bloedstelsel, de thymus en de ogen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P280 - Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.

P301+P330+P311 - NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een art raadplegen.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 - Bevat Cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H373 - Risque présumé d'effets graves pour le système sanguin, le thymus et les yeux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P263 - Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.

P280 - Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

P301+P330+P311 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche et appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

P391 - Recueillir le produit répandu.

P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH208 - Contient du Cymoxanil. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

UFI: 19MR-Y0M3-EVK2-8HTQ