

**Select Prim®**

UFI : PVG-GNM4-CH2X-CV5H

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS :**BE: 070/245.245 / LU: (+352) 8002 5500****Gevarenaanduidingen**

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel en damp vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P301 + P330 + P331 + P310 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat clethodim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bevat: zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), CAS: 64742-94-5

Mentions de danger

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P301 + P330 + P331 + P310 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler

immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient du clethodime. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Contient: solvant naphta aromatique lourd (pétrole), CAS: 64742-94-5

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel und Dampf vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P301 + P330 + P331 + P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält Clethodim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Enthält: Solvent Naphta, schwere aromatische, CAS: 64742-94-5

Toelatingsnummer: 9334P/B

Toelatingsnummer Luxemburg: L01898-071

Emulgeerbaar concentraat (EC)**op basis van** 120 g/l (12,9 % w/w) clethodim.**Mode d'action / Werkingswijze:****GROUP 1 HERBICIDE****Numéro d'autorisation: 9334P/B**

N° d'agrément luxembourgeois: L01898-071

Concentré émulsionnable (EC)**à base de** 120 g/l (12,9 % w/w) de clethodime.**Productiedatum/Date de fabrication:**

Zie op de verpakking/Voir sur

l'emballage

Lotnummer/Numéro de lot : Zie op de

verpakking/Voir sur l'emballage

Toelatingshouder/Détenteur de**l'autorisation:**

Arysta Lifescience S.A.S.

Route d'Artix

BP 80, F-64150 Noguères, France

Select® Prim: gedeponeerd handelsmerk van/marque déposée de Arysta Lifescience

**GEVAAR / DANGER /
GEFAHR****Verdeeld door/Distribué par:**

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda, Nederland / Pays-Bas

Tel. +31 (0)85 0712300



www.agrirecover.eu



BE 2640136 15-0525







GEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Lees aandachtig het etiket voor gebruik. De gewasgroepen in de tabellen hieronder geven structuur aan het etiket. Enkel de specifiek vermelde gewassen onder de kolom 'teelt' zijn toegelaten. De gebruiksvoorwaarden moeten per gewas geraadpleegd worden.

Toepassingstechniek: bespuiting

A. WORTEL- EN KNOLGEWASSEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Aardappelen (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag	1 l/ha	Toepassen van opkomst tot 9 bladstadium (BBCH 10-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Maximum 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 60 dagen.		
Aardappelpoot- goedteelt (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag	1 l/ha	Toepassen van opkomst tot 9 bladstadium (BBCH 10-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Suiker- en voederbieten (open lucht)	Eénjarige grasachtige onkruiden, hanenpoot, wilde haver, duist, graanop- slag en raigras	1 l/ha, 1 toepassing	Toepassen na-opkomst, van opkomst tot het 9-bladstadium (BBCH 10-19)
		0.5 l/ha, 2 toepassingen	Toepassen in na-opkomst op weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)
	Kweekgras	2.5 l/ha, 1 toepassing	Toepassen na-opkomst aan op ontwikkeld onkruid, vóór het verschijnen van de bloeiwijze (BBCH 19-49)
		1.25 l/ha, 2 toepassingen	Toepassen in na-opkomst op weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14)
		Toepassingsvoorwaarden: • Max. 2 toepassingen/teelt • De lagere dosissen mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie. • In geval van toepassing tegen kweekgras: Select® Prim niet mengen met andere herbiciden. • Select® Prim bevat voldoende olie om een goede effectiviteit op grassen te verzekeren. In een herbicidenmengsel (bijvoorbeeld FAR-systeem) wordt extra olie (Bv. Actirob® B) toegevoegd om de werking van de andere producten te waarborgen. De dosering van de olie of van de uitvloeier is afhankelijk van de weersomstandigheden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 90 dagen.	
	Schorseneren (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha Max. 2 toepassingen/teelt met een interval van 7-10 dagen
0.8 l/ha Max. 1 toepassing/ha/12 maanden			Toepassen in het 2-9 bladstadium van de teelt (BBCH 12-19)
Kweekgras		2 l/ha Max. 1 toepassing/12 maanden	Toepassen in het 2-9 bladstadium van de teelt (BBCH 12-19).
Toepassingsvoorwaarden: • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 40 dagen.			
B. BLADGROENTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Spinazie open lucht en onder bescherming	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	Toepassen in het 2-4 bladstadium van de teelt (BBCH 12-14), op onkruiden vanaf het opkomststadium tot het 9-bladstadium (BBCH 10-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel (open lucht): een bufferzone van 20 meter respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		



C. STENGELGROENTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Prei (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen vanaf het 2e bladstadium (> 3 cm) zichtbaar aanbrengen tot 9 of meer zichtbare bladeren (BBCH 12-19) van de teelt
	Kweekgras	2 l/ha	Toepassen wanneer 9 of meer bladeren zichtbaar zijn (BBCH 19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel (voor de teelt in open lucht): • Toepassing van 1 l/ha tussen BBCH 12-19: een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Toepassing van 2 l/ha op BBCH 19: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

D. PEULVRUCHTEN (groengeoogst)			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (onder bescherming)	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	Toepassen van opkomst tot 9-bladstadium (BBCH 10-19) van onkruiden
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 60 dagen		

E. PEULVRUCHTEN (drooggeoogst)			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Voedererwt (drooggeoogst) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	Toepassen van opkomst tot 9-bladstadium (BBCH 10-19) van onkruiden
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 60 dagen		

F. OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Winterkoolzaad (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en graanopslag	1 l/ha	Toepassen wanneer 2 bladeren ontvouwen tot begin verlenging van de hoofdstengel: geen internodia ('rozet') (BBCH 12-30)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 1 meter met 75 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 120 dagen		

G. SIERPLANTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Kerstsparen(niet bestemd voor consumptie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	2.5 l/ha	Toepassen op ontwikkeld onkruiden
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/12 maanden • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater		



Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

GEBRUIKEN CONFORM ARTIKEL 51 EG 1107/2009

Het gebruik van Select® Prim in de teelten vermeld in onderstaande tabel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen weinig of geen werkzaamheids- en/of fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

A. BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Aardbeien (productieveld) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	0,8 l/ha	Voor de bloei (< BBCH 60) of na de oogst, wanneer de laterale scheuten zich beginnen te vormen - de oude bladeren afsterven en de typische kleur van de variëteit hebben; de jonge bladeren draaien naar de grond (BBCH 91-93).
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden:		
	• Max. 1 toepassing/ha/12 maanden.		
	• Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
• Veiligheidstermijn vóór de oogst: 30 dagen.			
Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	0,8 l/ha	Toepassen na het planten.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden:		
	• Max. 1 toepassing/ha/12 maanden.		
	• Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		

B. WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Wortelen, pastinaak, knolselder (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen in het 2 tot 9 of meer van ontvouwen (BBCH 12-19) bladstadium.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 40 dagen.		
Rode biet (kroten), aardpeer, radijs, rammenas en retich, koolraap, raap (stop-pelraap, mierikswortel* (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	0,8 l/ha	Toepassen in het 2 tot 9 of meer van ontvouwen (BBCH 12-19) bladstadium.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 40 dagen. • Om gewasbeschadiging in mierikswortel te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.		
Wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortelen) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen in het 2 tot 9 of meer van ontvouwen (BBCH 12-19) bladstadium.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 40 dagen.		
Rode biet (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen - 9 of meer bladeren ontvouwen (BBCH 12-19)
	Doorlevende grasachtige onkruiden	2,5 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek.		
Wortelen (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen - de hoofdscheut heeft 30% van zijn grootte bereikt (BBCH 12-53)
	Doorlevende grasachtige onkruiden	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek.		



Radijs (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,8 l/ha	2de blad (> 3 cm) zichtbaar - 9 of meer bladeren zichtbaar (BBCH 12-19)
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek.		
C. BOLGEWASSEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Uien (drooggeoogste) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	/
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 56 dagen.		
Bosuien (lente-ui) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	In het 2 (> 3 cm) zichtbaar bladstadium (BBCH 12).
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 14 dagen.		
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Knoflook en sjalot (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	0,8 l/ha	Toepassen vanaf eerste blad (> 3 cm) zichtbaar tot 8e blad (> 3 cm) zichtbaar (BBCH 11-18).
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 56 dagen.		
D. KOOLSOORTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Bloemkool (witte en groene), broccoli, spruitkool, sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen tot het stadium 9 of meer ontvouwen bladeren (≤ BBCH 19).
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
E. BLADGROENTEN EN KRUIDEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Witloofwortelteelt (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen na-opkomst.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 56 dagen.		
Basilicum en peterselie (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Toepassen in het 2 - 6 bladstadium van de teelt (BBCH 12-16)
	Kweekgras	1,5 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Veldsla (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1,5 l/ha	Toepassen in 2 bladeren ontvouwen - 9 of meer bladeren ontvouwen (BBCH 12-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 14 dagen		





Warmoes (snijbiet) (open lucht)	eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	0,8 l/ha	2 bladeren ontvouwen - 4 bladeren ontvouwen (BBCH 12-14)	
	kweekgras	2 l/ha		
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teel ten het oppervlaktewater. • Waarschuwing : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.			
Peterselie (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen - 6 bladeren ontvouwen (BBCH 12-16)	
	Kweekgras	1,5 l/ha		
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			
F. PEULGROENTEN (groengeoogst)				
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip	
Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras en graanopslag	1 l/ha	Toepassen van opkomst tot 9-bladstadium (BBCH 10-19) van onkruiden.	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 m met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 30 dagen.			
	eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	9 of meer zijscheuten zichtbaar (≤ BBCH 39)	
Stamslabonen (prinsessen-, snijbonen) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teel ten het oppervlaktewater.			
	Vicia bonen (paarden-, druiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Totdat bloemknoppen worden gevormd maar nog steeds omhuld door bladeren (≤ BBCH 50)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			
Erwten (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren (met steunbladeren) ontvouwen of 2 ranken gevormd - 9 of meer internodia gevormd (BBCH 12-39)	
	Toepassingsvoorwaarden: • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek.			
	Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Groengeoogste erwten (zonder peul) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	9 of meer internodiën worden gevormd (≤BBCH 39)	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			
	Groengeoogste erwten (met peul) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	/
Soja / edamame (groengeoogst, met en zonder peul) (open lucht)	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met klassiek techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 30 dagen.			
	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	Drievoudig blad op 2de knoop ontvouwen tot 9de zijscheut van eerste orde zichtbaar (BBCH 12-29)	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 30 dagen			
G. STENGELGROENTEN				
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip	
Asperge (productieveld) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1,5 l/ha	Na de oogst	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			





Asperge (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1,5 l/ha	Toepassen op BBCH 09-31 (stengels doorboren het grondoppervlak - de langste stengel heeft een hoogte van 10 cm bereikt)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
H. OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Vanaf het drieluigblad op de 2de knoop ontvouwd is tot volledige bloei: 50% van de bloemen zijn geopend.
Soja (droogge oogst) (open lucht)	Kweekgras	2 l/ha	Belangrijkste periode van bloei (BBCH 12-65).
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Wintervlas, zomervlas, wintervlas (zaadproductie), zomervlas (zaadproductie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Na opkomst
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 70 dagen.		
Deder (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen - 2 internodia zichtbaar (BBCH 12-32)
	Toepassingsvoorwaarden: • Bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater met 75% driftreducerende techniek. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 120 dagen.		
Blauwmaanzaad (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	Negen of meer echte bladeren, bladparen of kransen ontvouwen - 9 of meer zijsechuent zichtbaar (BBCH 19-29)
	Toepassingsvoorwaarden: • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek. • Veiligheidstermijn vóór de oogst: 90 dagen.		
Zonnekroon (niet voor consumptie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden	0,8 l/ha	4de knoop van rozet en 4de bladpaar volledig ontwikkeld - 9 of meer knopen van rozet en 9 of meer bladparen volledig ontwikkeld (BBCH 14-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met 50% driftreducerende techniek.		
J. AROMATISCHE EN MEDICINALE KRUIDEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Engelwortel, lavas / maggiplant, kervel, snijseider, dille, karwij, koriander, citroenmelisse, munt en laurier (consumptie bladeren) (open lucht)	eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	Toepassen in het 2-4 bladstadium van de teelt (BBCH 12-14), op onkruiden vanaf het opkomststadium tot het 9-bladstadium (BBCH 10-19)
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Waarschuwing : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.		
Engelwortel en lavas / maggiplant (consumptie wortels) (open lucht)	eenjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen - 9 of meer bladeren ontvouwen (BBCH 12-19)
	kweekgras	2 l/ha	
Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Waarschuwing : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen. • Veiligheidstermijn vóór de oogst : 40 dagen.			
I. SIERPLANTEN			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Sierplanten (éénjarige), sierbomen en sierheesters, bol- en knolgewassen, rhizomen (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)	Eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	/
	Kweekgras	2 l/ha	
Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.			





K. OVERIGE			
Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdstip
Tagetes (aaltjesbestrijding) (open lucht)	Enjarige grasachtige onkruiden en straatgras	1 l/ha	Na-opkomst.
	Kweekgras	2 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/ha/12 maanden. • Risicobeperkende maatregel: een bufferzone van 20 meter met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater.		
Goudsbloem (niet voor consumptie) (open lucht)	Enjarige grasachtige onkruiden	1 l/ha	2 bladeren ontvouwen tot 6 bladeren ontvouwen (BBCH 12-16)
	Kweekgras	1,5 l/ha	
	Toepassingsvoorwaarden: • Max. 1 toepassing/teelt. • Risicobeperkende maatregel: Een bufferzone van 20 m met 50 % driftreductie respecteren tussen de te behandelen teelt en het oppervlaktewater. • Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.		

Algemene opmerking betreffende de dosis

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Product bestemd voor beroepsgebruik.
- Steeds behandelen bij gunstige weersomstandigheden. De beste resultaten worden verkregen op grassen in volle groei.
- Ter bestrijding van kweekgras: Select® Prim steeds alleen inzetten (dus niet mengen met andere herbiciden).
- De spuitoplossing moet de grassen kunnen raken, dus ingrijpen vooraleer er 'paraplueff' van de teelt optreedt. Vermijd spuitdrijf bij gevoelige teelten zoals maïs en graan gewassen.
- Select® Prim bevat voldoende olie om een goede effectiviteit op grassen te verzekeren.
- Aanbevolen watervolume: 200 à 400 l/ha
- Vervangteelten (in geval van gewas mislukking): alle tweezaadlobbige teelten.
- SPa1: Om resistentieopbouw te vermijden, moet u het gebruik van dit product afwisselen met producten die een andere werkingswijze hebben. De HRAC code voor de werkingswijze van de actieve stof van dit product is 1.
- Draag steeds basisbeschermingskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkleding vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeiottichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING, BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN.

Het product in de voor 1/2 gevulde spuitank gieten. Mengen en verder met water aanvullen.

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespeeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproei toestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden.

De aldus gespeelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspreiden op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften.

Vijsers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigt.
- SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen. (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe3: Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen. (zie risicobeperkende maatregelen).
- Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.
- Driftreductie: Vermijd spuitdrijf naar naburige vegetatie, gronden en waterlopen door een aangepaste spuitapparatuur, waterhoeveelheid en rijsnelheid. Spuit bij windstil weer met aangepaste druk naargelang de specifieke aanbevelingen voor drift reducerende doppen.
- Erosiegevoelige percelen: Het is ten eerste aanbevolen om erosie beperkende maatregelen te nemen op percelen die erosiegevoelig zijn om afspoeling naar oppervlaktewater tegen te gaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
- Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.
- Ietellen onder bescherming: Voordat u opnieuw in behandelde ruimten / kassen binnengaat, moet u die gedurende minimum 2 uur ventileren tot de sproei stof is opgedroogd.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen	
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.	
NA INSLIKKEN:	De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INADEMING:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:	Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.	

WAARBORG

Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.



USAGE ET DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit. Dans les tableaux ci-dessous, les plantes cultivées ont été regroupées afin de structurer l'étiquette. Seules les cultures mentionnées dans la colonne 'culture' sont autorisées. Les conditions d'utilisation doivent être consultées pour chaque culture.

Méthode d'application : pulvérisation

A. LÉGUMES-RACINES & LÉGUMES-TUBERCULES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Pommes de terre (plein air)	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 60 jours.		
Culture de plants de pommes de terre (plein air)	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Betteraves sucrières et fourragères (plein air)	Graminées annuelles, panic pied-de-coq, folle avoine, vulpin des champs, repousses de céréales et le ray-grass	1 l/ha, 1 application	Appliquer en post-émergence, de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19).
		0,5 l/ha, 2 applications	Appliquer en post-émergence sur adventices peu développées (BBCH 11-14).
	Chiendent	2,5 l/ha, 1 application	Appliquer en post-émergence sur adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)
		1,25 l/ha, 2 applications	Appliquer en post-émergence sur adventices peu développée (BBCH 11-14).
	Conditions d'application : • Max. 2 applications/culture. • Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur les sols lourds et/ou dans le cas où des résistance sont soupçonnées. • En cas d'une application pour lutter contre le chiendent: ne pas mélanger Select® Prim avec d'autres herbicides • Select® Prim contient suffisamment d'huile pour assurer une bonne efficacité sur les graminées. Dans un mélange d'herbicides (par ex. système FAR), de l'huile (par ex. Actirob® B) est ajoutée afin de garantir l'efficacité des autres produits. La dose de l'huile ou de l'adjuvant dépend des conditions climatiques. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 90 jours.		
Scorsonères (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha Max. 2 applications / culture à intervalle de 7-10 jours.	Appliquer au stade 1 à 2 feuilles de la culture (BBCH 11-12), sur adventices du stade émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19)
	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha Max. 1 application/ha/12 mois	Appliquer au stade 2 à 9 feuilles de la culture (BBCH 12-19).
	Chiendent	2 l/ha Max. 1 application/ha/12 mois	Appliquer au stade 2 à 9 feuilles de la culture (BBCH 12-19).
	Conditions d'application : • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 40 jours.		
B. LÉGUMES-FEUILLES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Epinard plein air et sous protection	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer au stade 2 à 4 feuilles de la culture (BBCH 12-14), sur adventices du stade émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19).
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque (plein air): respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface.		



C. LÉGUMES-TIGES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Poireau (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Appliquer du stade 2ème feuille (> 3 cm) visible à 9 ou davantage de feuilles visibles (BBCH 12-19) de la culture.
	Chiendent	2 l/ha	Appliquer au stade 9 ou davantage de feuilles visibles (BBCH 19)
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: • Application de 1 l/ha au stade BBCH 12-19 : respecter une zone tampon de 20 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Application de 2l/ha au stade BBCH 19 : respecter une zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50% entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
D. LÉGumineuses-Potagères (récoltées vertes)			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Haricot vert (récolté frais, avec cosse) (sous protection)	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19) des adventices.
Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Délai avant récolte: 60 jours.			
E. LÉGumineuses-Séchées			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Pois fourragers (récoltés secs) (plein air)	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19) des adventices.
Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 60 jours.			
F. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Colza d'hiver (plein air)	Graminées annuelles et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer au stade 2 feuilles étalées au stade début de l'élongation de la tige principale : pas d'entre-nœuds (« rosette ») (BBCH 12-30).
Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 75 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 120 jours.			
G. PLANTES ORNEMENTALES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Sapin de Noël (plein air) (non destinés à la consommation)	Graminées annuelles	2,5 l/ha	Appliquer sur adventices développées
Conditions d'application : • Max. 1 application/12 mois • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
Remarque générale concernant la dose La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.			
USAGES CONFORMES A L'ARTICLE 51 DU REGLEMENT 1107/2009 L'utilisation du produit Select® Prim dans les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessous a été évaluée conformément à l'article 51 du Règlement européen 1107/2009. Peu ou pas d'étude d'efficacité et/ou de phytotoxicité n'a été effectuée pour cet usage. Il est donc recommandé d'effectuer un essai de pulvérisation avant d'utiliser le produit. L'utilisation de ce produit dans ces cultures tombe donc sous la responsabilité de l'utilisateur.			
A. BAIES ET PETITS FRUITS			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Fraisiers (champ de production) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha	Avant la floraison (< BBCH 60) ou après la récolte, au moment où des pousses latérales commencent à se former - les anciennes feuilles meurent, elles atteignent une coloration typique de la variété, torsion des jeunes feuilles vers le sol (BBCH 91-93).
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 30 jours.			





Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha	Après la plantation.
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
B. LÉGUMES-RACINES & LÉGUMES-TUBERCULES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Carottes, panais et céleri-raves (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Appliquer au stade 2 à 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 40 jours.		
Betterave rouge, topinambour, radis, radis noir et radis rave, chou-navet, rutabaga, navet, et raifort* (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha	Appliquer au stade 2 à 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 40 jours. * Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture de raifort, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.		
Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Appliquer au stade 2 à 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 40 jours.		
Betterave rouge (pro- duction de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Graminées vivaces	2,5 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
Carottes (produc- tion de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - la pousse principale a atteint 30% de sa hauteur (BBCH 12-53)
	Graminées vivaces	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
Radis (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles	0,8 l/ha	2ème feuille (> 3 cm) visible - 9 ou davantage de feuilles visibles (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
C. LÉGUMES-BULBES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Oignons (récoltés secs) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	/
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 56 jours		





Oignons de printemps (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Au stade 2 feuilles (> 3 cm) visibles (BBCH 12).
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 14 jours.		
Ail et échalotte (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha	Appliquer au stade première feuille (> 3 cm) visible à 8ème feuille (> 3 cm) visible (BBCH 11-18).
	Chiendent	2 l/ha	
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 56 jours			
D. BRASSICACÉES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Chou-fleur (blanc et vert), chou brocoli, choux de Bruxelles, choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de Savoie) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Jusqu'au stade 9 ou davantage de feuilles étalées de la culture (≤ BBCH 19).
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
E. LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Bette (blette) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	0,8 l/ha	2 feuilles étalées - 4 feuilles étalées (BBCH 12-14)
	Chiendent	2 l/ha	
Conditions d'application: • Max. 1 application/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.			
Culture de racines de witloof (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Post-émergence.
	Chiendent	2 l/ha	
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 56 jours.			
Basilic et persil (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Appliquer au stade 2 à 6 feuilles de la culture (BBCH 12-16).
	Chiendent	1,5 l/ha	
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
Mâche (plein air)	Graminées annuelles	1,5 l/ha	Appliquer au stade 2 feuilles étalées - 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque : respecter une zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%. • Délai avant récolte : 14 jours		
Betterave rouge (pro- duction de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Graminées vivaces	2,5 l/ha	
Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.			





Carottes (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - la pousse principale a atteint 30% de sa hauteur (BBCH 12-53)
	Graminées vivaces	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
Radis (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles	0,8 l/ha	2ème feuille (> 3 cm) visible - 9 ou davantage de feuilles visibles (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
Persil (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - 6 feuilles étalées (BBCH 12-16)
	Chiendent	1,5 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
F. LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (récoltées vertes)			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Haricot vert (récolté frais, sans cosse) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	9 ou davantage de pousses latérales sont visibles (≤ BBCH 39)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Haricot vert (récolté frais, avec cosse) (plein air)	Graminées annuelles, pâturin annuel et repousses de céréales	1 l/ha	Appliquer de l'émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19) des adventices.
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 30 jours.		
Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Jusqu'à ce que les boutons floraux soient formés mais toujours enveloppés par des feuilles (≤ BBCH 50).
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Petit pois (sans cosse) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1l/ha	9 ou davantage d'entre-nœuds sont formés (≤ BBCH 39)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Pois verts (avec cosse) (mange-tout) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	/
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 m avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 30 jours.		
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Soja / edamame (récolté fraîche, avec et sans cosse) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	Appliquer au stade feuille trifoliolée, insérée sur le 2ème nœud, est étalée – neuvième pousse latérale de 1er ordre visible (BBCH 12-29)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque : respecter une zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%. • Délai avant récolte : 30 jours		





Pois (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles (avec stipules) sont étalées ou 2 vrilles sont formées (espèce sans limbe) - 9 ou davantage d'entre-nœuds sont formés (BBCH 12-39)
	Conditions d'application : • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		
G. LÉGUMES-TIGES			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Asperge (champ de production) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1,5 l/ha	Appliquer après la récolte.
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Asperge (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1,5 l/ha	Appliquer à BBCH 09-31 (les turions percent la surface du sol - la plus longue tige a atteint une hauteur de 10 cm)
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
H. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX			
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Soja (récolté sec) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	A partir du moment où la feuille trilobée insérée sur le deuxième nœud est étalée jusqu'à plein floraison : 50% des fleurs sont ouvertes.
	Chiendent	2 l/ha	Principale période de floraison (BBCH 12-65).
Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.			
Lin de printemps, lin d'hiver, lin de printemps (production de semences), lin d'hiver (production de semences) (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Post-émergence
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique classique entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Délai avant récolte: 70 jours.		
Caméline (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - 2 entre-nœuds visibles (BBCH 12-32)
	Conditions d'application : • Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%. • Délai avant la récolte : 120 jours		
Pavot (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	9 ou davantage de feuilles, de paires de feuilles, ou de verticilles sont étalés - 9 ou davantage de pousses secondaires visibles (BBCH 19-29)
	Conditions d'application : • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%. • Délai avant la récolte : 90 jours		
Silphie (pas pour la consommation) (plein air)	Graminées annuelles	0,8 l/ha	le 4e nœud de la rosette et la 4e paire de feuilles sont complètement développés - 9 ou plus nœud de la rosette et 9 ou plus de paire de feuilles complètement développés (BBCH 14-19)
	Conditions d'application : • Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%.		





I. PLANTES ORNEMENTALES

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Arbres et arbustes orientementaux, plantes ornementales annuelles, plantes ornementales à bulbes et à rhizomes (non destinés à la consommation) (olein air).	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	/
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		

J. PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Angélique, livèche, cerfeuil, céleri à couper, aneth, carvi, coriandre, mélisse, menthe et laurier (consommation des feuilles) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	Appliquer au stade 2 à 4 feuilles de la culture (BBCH 12-14), sur adventices du stade émergence au stade 9 feuilles (BBCH 10-19)
	Conditions d'application: • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.		
Angélique et livèche (consommation des racines) (plein air)	Graminées annuelles	1 l/ha	2 feuilles étalées - 9 ou davantage de feuilles étalées (BBCH 12-19)
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application: • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. • Délai avant récolte : 40 jours		

K. AUTRES

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Tagètes anti-néma- todes (plein air)	Graminées annuelles et pâturin annuel	1 l/ha	Post-émergence
	Chiendent	2 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/ha/12 mois. • Mesure de réduction du risque: respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de 50 % entre la culture à traiter et les eaux de surface.		
Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Souci (pas pour la consommation)	Graminées annuelles	1 l/ha	Appliquer au stade 2 feuilles étalées - 6 feuilles étalées (BBCH 12-16)
	Chiendent	1,5 l/ha	
	Conditions d'application : • Max. 1 application/culture. • Mesure de réduction du risque : respecter une zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de 50%. • Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.		

Remarque générale concernant la dose

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

- Produit destiné à un usage professionnel.
- Contre le chiendent, il faut toujours pulvériser le Select® Prim seul (donc ne pas le mélanger avec d'autres herbicides).
- Traiter toujours par conditions de croissance favorables. La meilleure efficacité est obtenue sur graminées en pleine croissance.
- Les graminées doivent être touchées par la bouillie de pulvérisation. Elles ne doivent pas être recouvertes par la culture. Faire attention à la dérive de la bouillie de pulvérisation vers les cultures sensibles (maïs, céréales).
- Select® Prim contient suffisamment d'huile pour assurer une bonne efficacité sur les graminées.
- Volume d'eau conseillé: 200 à 400 l/ha
- Cultures de remplacement (en cas d'échec de la culture): il est possible d'implanter toutes cultures de dicotylées.
- SPA1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode



d'action de la substance active de ce produit est 1.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE, TRAITEMENT DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Remplir la cuve à 1/2 d'eau. Ajouter le produit, mélanger et compléter le volume de la cuve. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

MESURES POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface. (voir mesures de réduction du risque).
- SPe3: Pour protéger les plantes non-cibées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive. (voir mesures de réduction du risque).
- En plus des zones tampons mentionnées sur l'étiquette, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.
- Réduction de la dérive: éviter la dérive sur la végétation, les plans et les cours d'eau par l'utilisation d'un équipement de pulvérisation approprié et en ajustant la quantité d'eau et la vitesse. Pulvériser en l'absence de vent et avec une pression adaptée conformément aux recommandations spécifiques pour les buses antidériver.
- Parcelles sensibles à l'érosion: Il est recommandé de mettre en place des mesures adaptées sur les parcelles sensibles à l'érosion afin d'empêcher le ruissellement vers les eaux de surface.

MESURES DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.
- Cultures sous protection: Ventilier pendant minimum 2 heures jusqu'au séchage du produit pulvérisé les zones / serres traitées avant d'y accéder.
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

INDICATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	
EN CAS D'INGESTION:	Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION:	Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:	Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Pour des informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245. Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500	

GARANTEE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur: nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



**Select Prim®**

UFI : PVG3-GNM4-CH2X-CV5H

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS :**BE: 070/245.245 / LU: (+352) 8002 5500****Gevarenaanduidingen**

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van nevel en damp vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P301 + P330 + P331 + P310 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Aanvullende informatie

EUH208 Bevat clethodim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bevat: zwaar aromatisch solvent-nafta (aardolie), CAS: 64742-94-5

Mentions de danger

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P301 + P330 + P331 + P310 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler

immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Informations supplémentaires

EUH208 Contient du clethodime. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Contient: solvant naphta aromatique lourd (pétrole), CAS: 64742-94-5

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel und Dampf vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P301 + P330 + P331 + P310 : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Ergänzende Informationen

EUH208 Enthält Clethodim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Enthält: Solvent Naphta, schwere aromatische, CAS: 64742-94-5

Toelatingsnummer: 9334P/B

Toelatingsnummer Luxemburg: L01898-071

Emulgeerbaar concentraat (EC)**op basis van** 120 g/l (12,9 % w/w) clethodim.**Mode d'action / Werkingswijze:****GROUP 1 HERBICIDE****Numéro d'autorisation: 9334P/B**

N° d'agrément luxembourgeois: L01898-071

Concentré émulsionnable (EC)**à base de** 120 g/l (12,9 % w/w) de clethodime.

Productiedatum/Date de fabrication:

Zie op de verpakking/Voir sur

l'emballage

Lotnummer/Numéro de lot : Zie op de

verpakking/Voir sur l'emballage

Toelatingshouder/Détenteur de**l'autorisation:**

Arysta Lifescience S.A.S.

Route d'Artix

BP 80, F-64150 Noguères, France

Select® Prim: gedeponeerd handelsmerk van/marque déposée de Arysta Lifescience

**GEVAAR / DANGER /
GEFAHR****Verdeeld door/Distribué par:**

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda, Nederland / Pays-Bas

Tel. +31 (0)85 0712300



www.agrirecover.eu

BE 2640136 15-0525



