

TOPPER®

GROEIREGULATOR

Groeiregulator in de teelt van appels en peren

PRODUCT BESTEMD VOOR BEROEPSGEBRUIK

Wateroplosbare tablet (ST) op basis van 10 % triclopyr (GR)
Erkenningsnummer: 9803P/B
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking

Erkenningshouder:
Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory 26 -1
4102 Ougrée
België

Verdeeld door:
UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, Block A,
4818 CP, Breda,
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)85 0712300

® Gedeponeerd handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.

TOEPASSING

Appelbomen en perenbomen (open lucht):

ter bestrijding van vroegtijdige vruchtval.

Toepassingsstadium: 3-4 weken voor de pluk.

Dosis: 12 tabletten/ha haag (20 tabletten/ha standaard boomgaard);
max. 1 toepassing/12 maanden.

Veiligheidstermijn: 21 dagen

Driftreducerende maatregelen: respecteer een minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

OPMERKINGEN

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen.
- Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
- Een ha standaard boomgaard is een boomgaard van een ha grondoppervlakte, beplant met bomen in productie (Behalve op de rijuiteinden, de zgn. wendakkers) van 3 m hoog in enkele rijen op een onderlinge afstand van 3,5 m die aan beide zijden worden bespoten.
- De totale hoeveelheid triclopyr/ha/jaar aangebracht door dit product of andere producten die triclopyr bevatten mag niet hoger zijn dan 480g/ha/12 maanden.

AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP

Eerste hulp maatregelen

Algemeen: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

TOPPER®

Erkenningsnummer: 9803P/B

Wateroplosbare tablet (ST) op basis van 10% triclopyr (GR).

Veiligheidsaanbevelingen:

P280 Beschermende handschoenen dragen.

Aanvullende informatie :

EUH208 Bevat triclopyr. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een buff erzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen

(zie risicobeperkende maatregelen).



www.agrirecover.eu

Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245

Opmerking voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het

Antigifcentrum (+32 (0)70/245.245).

AANWIJZINGEN VOOR LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker worden ingeleverd op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspreiden op het reeds behandeld perceel volgens de voorschriften.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product. Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruiksdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.



UPL

TOPPER®

RÉGULATEUR DE CROISSANCE

Régulateur de croissance en culture de pommes et poires

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Tablette soluble dans l'eau (ST) contenant 10 % de triclopyr (GR)
Numéro d'agrération: 9803P/B
Numéro de lot et date de production: voir emballage

Détenteur de l'agrération:
Arysta LifeScience Benelux Sprl.
Rue de Renory 26 -1
4102 Ougrée
Belgique

Distribué par:
UPL Benelux B.V.
Claudius Prinsenlaan 144a, Block A,
4818 CP, Breda,
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)85 0712300

® Marque déposée de Arysta LifeScience Benelux Sprl.

APPLICATION

Pommiers et poiriers (plein air):

pour lutter contre la chute prématurée des fruits.

Stade d'application: 3-4 semaines avant la récolte.

Dose: 12 tablettes/ha de haie (20 tablettes/ha verger standard); maximum 1 application/12 mois.

Délai avant récolte: 21 jours

Mesures anti-dérive: respectez une zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

REMARQUES

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

- Un ha de verger standard est un verger d'un ha de surface au sol, planté d'arbres en production (sauf aux extrémités, ce que l'on appelle les chaintres) de 3 m de haut en lignes simples avec une distance intermédiaire de 3,5 m.

- La quantité totale de triclopyr/ha/an apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du triclopyr ne peut pas dépasser 480g/ha/12 mois.

INDICATIONS POUR LES PREMIERS SECOURS

Premiers soins

Général: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

TOPPER®

Numéro d'agrération: 9803P/B

Tablette soluble dans l'eau (ST) contenant 10% de triclopyr (GR).

Conseils de prudence:

P280 Porter des gants de protection.

Informations additionnelles:

EUH208 Contient du triclopyr. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures /surfaces traitées avant

que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).



www.agrirecover.eu

Centre Antipoisons : +32 (0)70/245.245

Remarque pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons (+32 (0)70/245.245).

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux endommagements qui surviendraient suite à la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.

