

VACCIPLANT®

BIOCONTROL

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation : 9661P/B

Elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme in de teelt van aardbei, appel, peer, courgette / patisson en pompoen
Eliciteur des mécanismes de défense en cultures de fraises, pommes, poires, courgette / patisson et potiron
Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarine / Concentré soluble (SL) contenant 45 g/L de laminarine
Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel



WAARSCHUWING / ATTENTION

UFI: FXU6-QUDQ-GM23-MPW4

VACCIPLANT® - Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: 9661P/B

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarine. /
Concentré soluble (SL) contenant 45 g/L de laminarine.

Gevaar aanduidingen :

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Draag oogbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie :

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is P04.

Mentions d'avertissements:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P280 Porter un équipement de protection des yeux.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Informations additionnelles:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo Ne pas pénétrer dans ces cultures / surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque)

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code

FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est P04.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245



Inhoud / Contenu: 5Le





VACCIPLANT®

Gebruiksaanbevelingen / Préconisations d'emploi

Teelt / Culture	Ziekte / Maladie	Dosis / Dose	Toepassingstijdstip / Période d'application
Perenbomen (open lucht)	Bacterievuur (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,44 L/ha haag 1-5 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen	Vanaf het groene knopstadium (BBCH 56) tot het einde van de nabloei (BBCH 69). <u>Risicobeperkende</u> : Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Poiriers (plein air)	Feu bactérien (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,44 L/ha de haie 1-5 applications à intervalle d'au moins 7 jours	À partir du stade boutons vert (BBCH 56) jusqu'à la fin de floraison (BBCH 69). <u>Mesures de réduction du risque</u> : zone tampon minimale de 3 m par rapport aux eaux de surface.
Appelbomen (open lucht)	Bacterievuur (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,44 L/ha haag 1-5 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen	Vanaf het groene knopstadium (BBCH 56) tot het einde van de nabloei (BBCH 69). <u>Opmerking</u> : max. 20 toepassingen/12 maanden <u>Risicobeperkende</u> : Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Pommiers (plein air)	Feu bactérien (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,44 L/ha de haie 1-5 applications à intervalle d'au moins 7 jours	À partir du stade boutons vert (BBCH 56) jusqu'à la fin de floraison (BBCH 69). <u>Remarque</u> : max. 20 applications/12 mois <u>Mesures de réduction du risque</u> : zone tampon minimale de 3 m par rapport aux eaux de surface.
	Echte meeldauw / Oidium du pommier & du poirier (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,58 L/ha haag 1 tot 20 toepassingen	Preventief behandelen met een interval van 10 tot 20 dagen vanaf het stadium tweede val van de vruchten tot vruchten klaar voor consumptie: vruchten hebben typische smaak en stevigheid (BBCH 73-89). Bij hoge schurftdruk een specifiek fungicide toepassen. <u>Opmerking</u> : max. 20 toepassingen/12 maanden <u>Risicobeperkende</u> : Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater.
	Vruchtrot / pourriture amère (<i>Gloeosporium sp.</i>)	0,58 L/ha de haie 1 à 20 applications	Traiter préventivement tous les 10 à 20 jours du stade seconde chute des fruits jusqu'au stade où les fruits ont atteint la maturité demandée pour la consommation avec leurs goût et consistance typiques (BBCH 73-89). En cas de forte pression de tavelure appliquer un fongicide spécifique. <u>Remarque</u> : max. 20 applications/12 mois <u>Mesures de réduction du risque</u> : Zone tampon minimale de 3 m par rapport aux eaux de surface.
	Schurft / Tavelure du pommier (<i>Venturia inaequalis</i>)		





VACCIPLANT®

Aanbevelingen / Préconisations

Teelt / Culture	Ziekte / Maladie	Dosis / Dose	Toepassingstijdstip / Période d'application
Aardbeien (productieveld) (selectie- en vermeerderingsveld) (onder bescherming en open lucht)	Echte meeldauw (<i>Podosphaera aphanis</i>)	0,75 L/ha 1-7 toepassingen met een interval van 7-10 dagen	Preventief behandelen of volgens waarschuwingen vanaf het stadium 2 uitgespreide bladeren tot het stadium vorming nieuwe blaadjes met een kleiner bladoppervlak en een kortere steel dan de reeds gevormde (BBCH 12-92). <u>Risicobeperkende (open lucht)</u> : Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Fraisiers (champ de production) (champ de sélection et de multiplication) (sous protection et en plein air)	Oïdium (<i>Podosphaera aphanis</i>)	0,75 L/ha 1-7 applications à intervalle de 7-10 jours	Traiter préventivement ou selon les avertissements du stade 2 feuilles étalées jusqu'au stade formation de nouvelles feuilles avec un limbe plus petit et un pétiole plus court que les anciennes (BBCH 12 - 92). <u>Mesures de réduction du risque</u> : zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.
Pompoen (onder bescherming en open lucht)	Echte meeldauw (<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>E. orontii</i> , <i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> , <i>Podosphaera</i> <i>xanthii</i>)	0,75 L/ha 1 tot 6 toepassingen	Preventief behandelen met een interval van 5 tot 7 dagen. <u>Toepassingsstadium</u> : 2 bladeren op hoofdstengel ontvouwen - volledig rijp: vruchten hebben typische volrijpe kleur (BBCH 12-89) <u>Risicobeperkende (open lucht)</u> : Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Potiron (sous protection et en plein air)	Oïdium (<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>E. orontii</i> , <i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> , <i>Podosphaera</i> <i>xanthii</i>)	0,75 L/ha 1 à 6 applications	Traiter préventivement tous les 5 à 7 jours. <u>Stade d'application</u> : 2 feuilles étalées sur la tige principale - maturation complète: les fruits ont atteint leur couleur typique de pleine maturité (BBCH 12-89). <u>Mesures de réduction du risque (plein air)</u> : zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.
Courgette/patisson (onder bescherming en open lucht)	Echte meeldauw (<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>E. orontii</i> , <i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> , <i>Podosphaera</i> <i>xanthii</i>)	0,75 L/ha haag (verticale teelt onder bescherming) of 0,75 L/ha (open lucht and horizontale teelt onder bescherming) 1 tot 6 toepassingen	Preventief behandelen met een interval van 5 tot 7 dagen. <u>Toepassingsstadium</u> : 2 bladeren op hoofdstengel ontvouwen - 9 of meer vruchten op hoofdstengel hebben typische grootte en vorm bereikt (BBCH 12-79) <u>Risicobeperkende (open lucht)</u> : Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.
Courgette/patisson (sous protection et en plein air)	Oïdium (<i>Erysiphe polyphaga</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>E. orontii</i> , <i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> , <i>Podosphaera</i> <i>xanthii</i>)	0,75 L/ha de haie (culture verticale sous protection) ou 0,75 L/ha (plein air et culture horizontale sous protection) 1 à 6 applications	Traiter préventivement tous les 5 à 7 jours. <u>Stade d'application</u> : 2 feuilles étalées sur la tige principale - 9 ou davantage de fruits ont atteint leur taille et forme typiques sur la tige principale (BBCH 12-79) <u>Mesures de réduction du risque (plein air)</u> : zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

Andere vermeldingen/ Autres mentions

Dit middel is toegelaten als een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico. / Ce produit est autorisé comme produit phytopharmaceutique à faible risque.





VACCIPLANT®

Vacciplant stimuleert het natuurlijke afweermecanisme van de plant en geeft de plant zo meer bescherming tegen pathogenen zonder op zichzelf een bactericide of fungicide te zijn. Laminarine, de werkzame stof van Vacciplant, is een molecule van natuurlijke oorsprong, geëxtraheerd uit bruine algen.

OPMERKINGEN

Maximaal 500 L water per hectare.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Dit middel is toegelaten als een gewasbeschermingsmiddel met een laag risico. Draag steeds basisbeschermingskleding die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

Risicobeperkende maatregelen:

- Appel en peer: Minimale bufferzone van 3 m ten opzichte van oppervlaktewater.
- Aardbeien, courgette/patison en pompoen in open lucht: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

BEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF:

Het product goed schudden voor gebruik. De juiste hoeveelheid Vacciplant afmeten en toevoegen aan een met water gevulde spuitank. Vervolgens goed roeren tijdens het aanvullen van de spuitank. De verpakking reinigen met water en de inhoud in de spuitank gieten. De spuitvloeistof meteen na het aanmaken toepassen.

MENGBAARHEID: Vacciplant kan worden gemengd met de meeste gangbare middelen. Raadpleeg uw leverancier of voorlichter over de mengmogelijkheden van dit product. De mengingen moeten toegepast worden conform de geldende regelgeving en conform de goede landbouwpraktijken.

AANWIJZINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Eerst hulp maatregelen

Algemeen: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor de behandeling na ziekenhuisopname.

Voor bijkomende inlichtingen, **contacteer het Antigifcentrum: +32 (0)70/245.245.**

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuitank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De behandelingsoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

GARANTIE

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, de hantering, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport, het hanteren of het gebruik ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over de aangegeven gebruiksdoeleinden van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het aangewezen vooraf informatie bij ons in te winnen.





VACCIPLANT®

Vacciplant stimule les défenses naturelles des cultures et renforce ainsi leur résistance contre les pathogènes, sans être un bactéricide ni un fongicide. La matière active de Vacciplant, la laminarine, est une molécule naturelle extraite d'une algue brune.

REMARQUES

Maximum 500 L d'eau par hectare.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Ce produit est autorisé comme produit phytopharmaceutique à faible risque. Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistants aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

Mesures de réduction du risque:

- Pommiers et poiriers: zone tampon minimale de 3 m par rapport aux eaux de surface
- Fraisiers, courgette/patison et potiron en plein air: zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:

Bien agiter le bidon, verser la quantité requise de Vacciplant dans la cuve du pulvérisateur en cours de remplissage, compléter ensuite avec l'eau nécessaire à l'application en maintenant l'agitation. Pulvériser la bouillie rapidement après préparation. Rincer l'emballage et verser les eaux de rinçage dans le pulvérisateur.

COMPATIBILITÉ: Vacciplant peut être mélangé avec la plupart des produits couramment utilisés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur ou conseiller technique. Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

Instructions des premiers soins

Général: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

En cas d'ingestion: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec la peau: enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, **contacter le Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245.**

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

GARANTIE

Des examens approfondis ont démontré que le produit, si utilisé conformément à nos instructions, convient aux utilisations décrites. Toutefois, comme la conservation, la manutention, le transport et l'usage échappent à notre contrôle, et d'autant plus qu'il nous est impossible de prévoir toutes les circonstances, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus et/ou aux dommages qui surviendraient suite à la conservation, la manutention, le transport ou l'usage du produit. Nous garantissons uniquement la qualité constante du produit fourni. En cas de doute ou d'incompréhension quant aux utilisations décrites du produit sur des cultures nouvelles et/ou inhabituelles, sur de nouvelles races etc., veuillez nous contacter d'avance afin d'obtenir de plus amples informations.



VACCIPLANT®

BIOCONTROL

Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation : 9661P/B

Elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme in de teelt van aardbei, appel, peer, courgette / patisson en pompoen
Eliciteur des mécanismes de défense en cultures de fraises, pommes, poires, courgette / patisson et potiron
Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarine / Concentré soluble (SL) contenant 45 g/L de laminarine
Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel



WAARSCHUWING / ATTENTION

UFI: FXU6-QUDQ-GM23-MPW4

VACCIPLANT® - Toelatingsnummer / Numéro d'autorisation: 9661P/B

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarine. /
Concentré soluble (SL) contenant 45 g/L de laminarine.

Gevaar aanduidingen :

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.

P280 Draag oogbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie :

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is P04.

Mentions d'avertissements:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

P261 Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation.

P280 Porter un équipement de protection des yeux.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Informations additionnelles:

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPo Ne pas pénétrer dans ces cultures / surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque)

SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est P04.

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0)70/245.245



Inhoud / Contenu: 5Le

