

VACCIPLANT®

BIOCONTROL

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarin

Elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme in de teelt van aardbei, stokslaboon, stoksnijsboon en vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare & niet-eetbare schil

Toelatingsnummer : 16900 N

Chargenummer : zie verpakking

Vacciplant mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw. Vacciplant is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.

* Gedeponoerd handelsmerk van Laboratoires GOËMAR S.A.S.

Toelatingshouder:

Laboratoires Goëmar SAS
Parc Technopolitain Atalante
CS 41908
35435 SAINT-MALO Cedex

Distributeur:

UPL Benelux BV
Claudius Prinselaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300
<http://www.upl-ltd.com/nl>



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

VACCIPLANT®

Toelatingsnummer : 16900 N

Werkzame stof: laminarin

Gehalte: 45 g/L

Formulering: met water mengbaar concentraat (SL)

Gevenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/

oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P302 + P352 Bij CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

UFI: 4MS6-1US0-6M2R-SG5D

WAARSCHUWING



3 559270 104378

Inhoud : 1 L



VACCIPLANT®

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha* ¹	7	14	7
Stokslaboon en stoksnijsboon (bedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶ valse meeldauw ⁷ echte meeldauw ^{8,9}	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶ valse meeldauw ⁷ echte meeldauw ^{8,9}	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte niet grondgebonden teelt)	grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
	echte meeldauw ¹⁰ bladvlekkenziekte ¹¹	1 l/ha 2 l/ha	7 7		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Dosering afhankelijk van ziektedruk

⁵ echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

⁶ grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

⁷ valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

⁸ echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

⁹ echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)

¹⁰ echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

¹¹ bladvlekkenziekte (*Pseudomonas syringae* pv tomato)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

VACCIPLANT®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Voederbiet (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ bladvlekkenziekte ¹²	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Droog te oogsten erwten (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Droog te oogsten bonen (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Sla (bedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶ valse meeldauw ¹³	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Sla (onbedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶ valse meeldauw ¹³	0,75 l/ha	7	5,25	10
Andijvie (bedekte grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Andijvie (onbedekt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Spinazie-achtigen (bedekte grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Spinazie-achtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Postelein (bedekte grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Postelein (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Waterkers (bedekte niet-grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Waterkers (onbedekt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Veldsla (bedekte grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Veldsla (onbedekt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Rucola (bedekte grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Rucola (onbedekt)	grauwe schimmel ⁶ echte meeldauw ⁵	0,75 l/ha	7	5,25	10
Zeeaster (bedekte grondgebonden teelt)	grauwe schimmel ⁶ echte meeldauw ⁵	1,5-2 l/ha* ¹	6	12	7
Zeeaster (onbedekt)	grauwe schimmel ⁶ echte meeldauw ⁵	0,75 l/ha	7	5,25	10

VACCIPLANT®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Kiemgroenten (bedekte niet grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ¹	6	12	7
Kiemgroenten (onbedekte teelt)	grauwe schimmel ⁶ echte meeldauw ⁵	0,75 l/ha	7	5,25	10
Baby leaves	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Peulgroenten	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Boon met peul (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Boon zonder peul (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Erwt met peul (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Erwt zonder peul (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (onbedekt)	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet-eetbare schil (onbedekt)	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Aubergine (onbedekt)	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Koolgewassen (bedekt)	echte meeldauw ³ , Grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ¹	7	14	7



VACCIPLANT®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Kruidenteelt	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	0,75 l/ha	7	5,25	10
Koolrabi (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Radijs-achtigen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Suikerwortel (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Pastinaak (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Knolraap, koolraap, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorsenseer, mierikswortel, jam (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Eerstejaars en tweedejaars plantui, zilverui en picklers (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Sjalotten (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7
Bosuien (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha* ¹	7	14	7



VACCIPLANT®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Knoflook (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Stengelgroenten (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Potplanten (incl. perkplanten) (onbedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Potplanten (incl. perkplanten) (bedekte niet grondgebonden teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Snijbloemen	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Trekheesters	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Snijgroen	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha ^{*1}	7	14	7
Laanbomen (onbedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha ^{*1}	33	33,75	7
Klimplanten (onbedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha ^{*1}	33	33,75	7
Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha ^{*1}	33	33,75	7



VACCIPLANT®

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt)	schurft ¹ echte meeldauw ² grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha*1	33	33,75	7
Heide soorten (onbedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha*1	33	33,75	7
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1-2 l/ha*1	33	33,75	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	schurft ² echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha*1	7	14	7
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	echte meeldauw ³ grauwe schimmel ⁴	1-2 l/ha*1	33	33,75	7
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha*1	7	14	7
Bloemenzaadteelt	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha*1	7	14	7
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras	echte meeldauw ⁵ grauwe schimmel ⁶	1,5-2 l/ha*1	7	14	7

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Dosering afhankelijk van ziektedruk

² schurft (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*)

³ echte meeldauw (*Podosphaera leucotricha*)

⁵ echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

⁶ grauwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

¹² bladvlekkenziekte (*Cercospora*)

¹³ valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor van nature voorkomende of uitgezette natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Indien u natuurlijke vijanden heeft uitgezet: raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel.

Eerste Hulpmaatregelen

Na inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Na contact met de huid: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Trek vervuilde kleding uit.

Na contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Na opname door de mond: Mond spoelen. Afhankelijk van de hoeveelheid die is binnen gekregen, medische hulp inschakelen.

Aanbevelingen

Laminarine, de werkzame stof van Vacciplant, is een stof van natuurlijk oorsprong, geëxtraheerd uit bruine algen. Vacciplant mag gebruikt worden in biologische landbouw. Vacciplant stimuleert het natuurlijke afweermecanisme van de plant en geeft de plant zo meer bescherming tegen pathogenen zonder op zichzelf een bactericide of fungicide te zijn. Daarom dient het middel steeds preventief ingezet te worden.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van UPL zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat UPL in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

VACCIPLANT®

BIOCONTROL

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 45 g/L laminarin

Elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme in de teelt van aardbei, stokslaboon, stoksnijsboon en vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare & niet-eetbare schil

Toelatingsnummer : 16900 N

Chargennummer : zie verpakking

Vacciplant mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw. Vacciplant is geregistreerd op de Nederlandse inputlijst voor de biologische landbouw.

* Gedeponneerd handelsmerk van Laboratoires GOËMAR S.A.S.

Toelatingshouder:
Laboratoires Goëmar SAS
Parc Technopolitain Atalante
CS 41908
35435 SAINT-MALO Cedex

Distributeur:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300
<http://www.upl-ltd.com/nl>



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

VACCIPLANT®

Toelatingsnummer : 16900 N

Werkzame stof: laminarin

Gehalte: 45 g/L

Formulering: met water mengbaar concentraat (SL)

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

UFI: 4MS6-1U50-6M2R-SG5D

WAARSCHUWING



Inhoud : 1 L



3 559270 104378

VACCIPLANT®

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als elicitor van het zelfverdedigingsmechanisme voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei	echte meeldauw ⁵ grouwe schimmel ⁶	1-2 l/ha* ¹	7	14	7
Stokslaboon en stoksnijsboon (bedekte teelt)	grouwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	grouwe schimmel ⁶ valse meeldauw ⁷ echte meeldauw ^{8,9}	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)	grouwe schimmel ⁶ valse meeldauw ⁷ echte meeldauw ^{8,9}	3 l/ha	7	21	7
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte niet grondgebonden teelt)	grouwe schimmel ⁶	3 l/ha	7	21	7
	echte meeldauw ¹⁰	1 l/ha	7		
	bladvlekkenziekte ¹¹	2 l/ha	7		

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Dosering afhankelijk van ziektedruk

⁵ echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*)

⁶ grouwe schimmel (*Botrytis cinerea*)

⁷ valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

⁸ echte meeldauw (*Erysiphe cichoracearum*)

⁹ echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea*)

¹⁰ echte meeldauw (*Leveillula taurica*)

¹¹ bladvlekkenziekte (*Pseudomonas syringae* pv tomato)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.