Nr pozwolenia: Decyzja MRiRW Nr 541/19 z dnia 13.03.2019 r.

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:
Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, co najmniej 2,1 % (m/m)
Zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, co najmniej 1,7 % (m/m)
Zawartość manganu (Mn), co najmniej 1,47 % (m/m)
Zawartość cynku (Zn), co najmniej 1,52 % (m/m)
Zawartość substancji organicznej, co najmniej 54,7 % (s.m.)

Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100%

Producent:
Laboratoires Goemar S.A.S. Parc Technopolitain Atlante CS 41908, 35435 Saint-Malo Cedex, Republika Francuska

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90,
e-mail: sekretariat@upl-ltd.com

COLORADO

Nawóz organiczno-mineralny

Zakres stosowania nawozu
COLORADO jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym filtrat z alg *Ascophyllum nodosum (GA142).* Nawóz poprawia wybarwienie i odżywienie dojrzewających owoców.

Wielkość dawek nawozu, sposób i terminy stosowania

Zakres stosowania	Termin stosowania	Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym	Dawka
Jabłoń	Na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem	2	5 l/ha
Pomidor, papryka	Od zawiązania owoców co 2-3 tygodnie	2-4	Uprawy polowe 2,5-5 l/ha Uprawy pod osłonami 0,3-0,5%

COLORADO stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie roślin. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu używanego opryskiwacza.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy, przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

UWAGA
Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.

Sposób sporządzania cieczy użytkowej nawozu
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną ilość nawozu. Następnie wstrząsnąć pojemnik z nawozem i odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Po dokładnym wymieszaniu zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku stosowania mieszaniny z innymi nawozami, COLORADO dodawać do zbiornika jako ostatni.

Przechowywanie nawozu
– przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C,
– przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku,
– z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,
– w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Środki ostrożności
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Zapobiec powstawaniu oparów. Nawóz działa drażniąco na skórę oraz powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub oczu: Zasięgnąć porady lekarskiej.
Unikać uwolnienia do środowiska.

Informacje wynikające z przepisów odrębnych



Niebezpieczeństwo

H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: chlorek cynku

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji.

Masa netto nawozu: