


Chroń swój rzepak z fungicydami Corteva!



- Poznaj nowe rozwiązania fungicydowe dla rzepaku od Corteva:
 - **Colverado® 240 EC** • **Jacobo™ Pak**
- Ochrona przed najważniejszymi chorobami grzybowymi w rzepaku ozimym
- Wykorzystanie najbardziej efektywnych substancji do ochrony fungicydowej!
- Produkty o działaniu zabezpieczającym oraz interwencyjnym
- Regulacja pokroju rzepaku zwiększająca wyrównanie plantacji


REJESTRUJ
ZAKUPY NA
www.e-pole.pl
I WYMIENIAJ PUNKTY
NA NAGRODY!

Najważniejsze choroby występujące w uprawie rzepaku i progi szkodliwości



próg
ekonomicznej
szkodliwości:
10-15%

SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH (sprawca: *Leptosphaeria maculans* i *Leptosphaeria biglobosa*)



próg
ekonomicznej
szkodliwości:
10-30%

CZERN KRZYŻOWYCH (sprawca: *Alternaria*)



próg
ekonomicznej
szkodliwości:
1%


ZGNILIZNA TWARDZIKOWA (sprawca: *S. sclerotiorum*)



próg
ekonomicznej
szkodliwości:
10-15%

SZARA PLEŚŃ (sprawca: *Botrytis cinerea*)

Fungicydowa ochrona rzepaku



Colverado® 240 EC

Substancja czynna		protiokonazol 80g/l, tebukonazol 160g/l	
Uprawy		rzepak ozimy	rzepak jary
Zwalczane choroby		sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych	sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń (w dawce 1 l/ha)
Maksymalna / zalecana dawka	 MAX	0,75- 1 l/ha	
Termin stosowania		stosować jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku (BBCH 14–18) stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi	stosować wiosną od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30–57) stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem
Liczba zabiegów		2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną)	1
Zalecana ilość wody		200–400 l/ha	
Zalecane opryskiwanie		drobnokropliste	
Okres karencji		56 dni	

Jacobo™ Pak

(Pakiet handlowy składający się z fungicydów zawierających w swoim składzie difenokonazol oraz boskalid, dostępny w opakowaniach na 5 ha oraz 12 ha*)

Produkt		Agrizole® XL	Locumba®
Substancja czynna		difenokonazol 500 g/l	boskalid 500 g/kg
Uprawy		rzepak ozimy i jary	
Zwalczane choroby		czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa	czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, biała plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza)
Maksymalna / zalecana dawka	 MAX	0,25 l/ha	0,2–0,5 kg/ha
Termin stosowania		od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia	od początku wegetacji wiosennej – początek wydłużania łodygi, brak międzywęźli do fazy żółtego pąka
Liczba zabiegów		1	2
Zalecana ilość wody		100–400 l/ha	
Zalecane opryskiwanie		drobnokropliste	
Okres karencji		56 dni	niewymagany

* Dotyczy produktu wodącego Agrizole® XL