

Leander® COMPLEX Pak

Leander® 750 EC, Poleposition® 300 EC

Wszystko, czego potrzebujesz!



NOWOŚĆ!



Tarcza chroniąca
przed chorobami
zboź!

Leander COMPLEX Pak to rozwiązanie fungicydowe oparte na dwóch produktach: Leander 750 EC i Poleposition 300 EC

Oba fungicydy aplikowane w mieszance zbiornikowej w terminie pierwszego zabiegu T1, niezwykle skutecznie chronią zboża przed najpowszechniejszymi chorobami, występującymi we wczesnym okresie rozwoju zbóż. Wykazują działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne.

Skuteczna ochrona młodych roślin pozwala na ich lepszy rozwój, a w konsekwencji daje podstawy dla wysokiego plonowania.


Leander COMPLEX Pak aplikowany w terminie BBCH 32 bardzo skutecznie zwalczał mączniaka prawdziwego zbóż, był bezpieczny i selektywny dla rośliny uprawnej.

Mączniak prawdziwy zbóż jest najpowszechniejszą chorobą zbóż. Grzyb zazwyczaj zimuje w postaci grzybni na oziminach i wieloletnich trawach. Bardzo często rozwija się już w okresie jesiennym. Porażeniu sprzyja długa i ciepła jesień oraz zwilżenie roślin powodowane przez opady, rosę lub mgłę.

Na porażonych liściach grzybnia mączniaka rozwija się po obu stronach blaszek liściowych. Najpierw jest ona rozproszona, biała i cienka, z czasem staje się grubsza, filcowata i ciemniejsza. W pierwszej kolejności atakowane są dolne liście, później choroba przenosi się coraz wyżej, aż do kłosów. Silnie porażone liście przedwcześnie obumierają.

Szkodliwość tego patogena jest bardzo duża. Straty plonu powodowane przez mączniaka prawdziwego sięgają kilkudziesięciu procent.

Zwalczanie mączniaka prawdziwego




Źródło: średnia z doświadczeń ścisłych; pszenica ozima 2020; BBCH 32.

Ponieważ patogen może rozwijać się w niskich temperaturach, wczesne i skuteczne jego zwalczanie wymaga zastosowania fungicydów działających w niskich zakresach temperatur takich jak Leander 750 EC, który wchodzi w skład **Leander COMPLEX Pak**. Rekomendowana dawka to 0,4 l/ha Leander 750 EC i 0,4 l/ha Poleposition 300 EC.

W warunkach silnej presji patogena, należy dostosować dawkę do stopnia porażenia.

Leander COMPLEX Pak

- ▶ skuteczny na choroby,
- ▶ bezpieczny dla zbóż,
- ▶ wysoki, jakościowy plon.



Presja chorób grzybowych każdego roku jest inna i zależy od m.in. panujących warunków pogodowych, przebiegu jesieni i zimy, wrażliwości odmiany na choroby, ale także czynników agrotechnicznych. Jedno jest pewne: choroby grzybowe zbóż zawsze się pojawiają na plantacjach.

Dobór skutecznych fungicydów jest coraz bardziej ograniczony, ale nadal można sięgnąć po produkt niezawodny – Poleposition 300 EC.

Poleposition 300 EC

- ▶ substancja czynna – protiokonazol 300 g/l,
- ▶ doskonała ochrona przed chorobami grzybowymi,
- ▶ działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco,
- ▶ uniwersalny – zarejestrowany do stosowania w zbożach ozimych i jarych oraz w rzepaku ozimym i jarym.

Poleposition 300 EC – bezkonkurencyjny w ochronie fungicydowej zbóż

Substancja czynna	łamliwość podstawy źdźbła	mączniak prawdziwy zbóż i traw	septorioza liści	rdza żółta	rdza brunatna	fuzarioza kłosów
protiokonazol	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

●●●●● najwyższa skuteczność ●●●●● najniższa skuteczność

Źródło: AHDB, 04/2019.

- ▶ **Pszenica ozima i jara**
- ▶ **Jęczmień ozimy i jary**
- ▶ **Pszenżyto ozime**
- ▶ **Żyto ozime**

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy widocznego liścia flagowego do początku fazy kwitnienia.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha.

W przypadku ochrony przed fuzariozą kłosów – zalecana dawka dla zastosowania: 0,65 l/ha.

Termin stosowania: zaraz po wykłoszeniu, gdy widoczne są pierwsze pylniki do końca fazy kwitnienia.



septorioza plew



mączniak prawdziwy
zbóż i traw



septorioza paskowana
liści pszenicy



rdza żółta



plamistość siatkowa
jęczmienia



rdza brunatna



rynychosporioza
zbóż



fuzarioza kłosów
zbóż



brunatna plamistość
liści*

* średni poziom zwalczania

Mączniak prawdziwy w sprzyjających warunkach może pokryć nawet do 80% liści, które żółkną, a następnie zamierają. Infekcja liścia flagowego i plew może prowadzić do znacznego obniżenia masy tysiąca ziaren, a w efekcie powodować drastyczny spadek plonu i jego jakości.

Leander 750 EC skutecznie zapobiega takim niepowetowanym stratom.

Leander 750 EC

- ▶ doskonale zwalcza mączniaka prawdziwego w zbożach ozimych i jarych,
- ▶ do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego,
- ▶ skuteczny również w niskich temperaturach.



mączniak prawdziwy na źdźbło



mączniak prawdziwy na liściu

Leander 750 EC – pierwszy na mączniaka


- ▶ **Zboża ozime:**
pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime
– mączniak prawdziwy zbóż i traw.
- ▶ **Zboża jare:**
jęczmień jary, pszenica jara
– mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara – termin stosowania: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary – termin stosowania: od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości.

Leander 750 EC stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Leander 750 EC 0,75 l/ha



ZESKANUJ KOD



® zarejestrowana nazwa Globachem NV: Poleposition.
Zarejestrowana nazwa ADAMA Polska: Leander.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska