



kukurydza

MEZOFLO[®]

103 SC

**Substancja
aktywna:**

mezotrión - 100 g/l
florasulam - 3 g/l



2 substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania - hamują wzrost i rozwój chwastów

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie kukurydzy

Długi termin stosowania po wschodach rośliny uprawnej, od 2 do 8 liści kukurydzy

Efekt widoczny już po 5-7 dniach od zabiegu
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach

Dostępne opakowania: 1l, 5l

Dostępne marki: Flocom 103 SC

WWW.SYNTHOSAGRO.COM

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.



kukurydza

MEZOFLOR[®]

103 SC

Chwasty	Dawka	Termin stosowania
Chwasty wrażliwe: rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	1 l/ha	Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna (nadmorska), przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku		
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna		
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna (nadmorska), przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	1,25 l/ha	
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku		

EKSPERT RADZI

- ✓ możliwość elastycznego doboru dawki dopasowanej do występującego zachwaszczenia,
- ✓ możliwość stosowania z innymi herbicydami jako komponent pełnej technologii (doskonały partner dla produktów opartych na terbutylazynie oraz nikosulfuronie),
- ✓ produkt może być stosowany co roku,
- ✓ w formulacji zastosowano adiuwanty podnoszące skuteczność biologiczną produktu i stabilność substancji aktywnych podczas przechowywania oraz podczas przygotowania cieczy użytkowej w zbiornikach opryskowych.