VADEMECUM SKUTECZNEGO ZWALCZANIA STONKI

Mospilan® 20 SP

Monitoring plantacji należy prowadzić już od momentu pojawienia się części zielonych rośliny.

Pierwsze na plantacji pojawiają się chrząszcze – gdy temperatura gleby osiągnie 15°C, wychodzą z gleby nieregularnie przez okres nawet 2–3 tygodni. Dlatego warto rozpocząć ochronę insektycydową odpowiednio wcześnie – **najlepiej w okresie masowego składania jaj i wylęgania się larw I pokolenia**. Zapobiegnie to namnożeniu się szkodnika.

Jeden zabieg może okazać się nieefektywny. Warto wykonać sekwencję zabiegów, stosując produkty zawierające **różne substancje czynne**.

Zabiegi należy wykonywać **po przekroczeniu progów szkodliwości.** Dla stonki wynoszą one: 10 złóż jaj na 10 roślinach lub 15 larw na roślinie, lub 1–2 chrząszcze na 1 m^2.

Zabiegi należy wykonywać w **odpowiedniej temperaturze** (w okresach upałów – w godzinach wczesnoporannych).

Należy użyć **odpowiedniej ilości wody, czyli 200–400 litrów** (im większy łan, tym większa ilość wody).

Zalecana ilość wody:
200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie:
średniokropliste.
Okres karencji: 3 dni.



SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.