

PPC $\text{TiC}(\text{H})(\text{B})$

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

Silver Mix®

Nawóz mikroskładnikowy w roztworze

Skład % (m/m)

bor (B) - 0.33%, kobalt (Co) - 0.03%

miedź (Cu) - 0.45%, mangan (Mn) - 0.8%

molibden (Mo) - 0.1%, cynk (Zn) - 0.8%

+ srebro (Ag) - 133 mg/kg

bor (B) w postaci soli sodowej kwasu borowego, rozpuszczalnej w wodzie; kobalt (Co), miedź (Cu), mangan (Mn) cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie; molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie

1% (m/m) azot całkowity (N),

1% (m/m) katownię pięciotlenek fosforu (P_2O_5)

Zakres pH gwarantujący stabilność frakcji schelatowanej: 4-7
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Data produkcji: 01.2025 Numer partii PLN-2025/01



wyprodukowany
w nanotechnologii
SCS-tech®



Producent: Bosagra Sp. z o.o.,
ul. Jaama 4, Paldiski, Hrabstwo Harju, 76806, Estonia.
Zakres temperatury przechowywania: +2°C do +30°C
Okres gwarancyjny przechowywania: 2 lata od daty produkcji



NIEBEZPIECZESTWO

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w tonie matki, H360F Może działać szkodliwie na płodność, H411 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, P202 Nie używać przed zapoznaniem się z zsumowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, P273 Unikać uwolnienia do środowiska, P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, P501 Zebrać wywzrostek, nie usuwać przed zanieczyszczeniem, P501 Zawartość/pojemnik usunąć do zgodnie z przepisami krajowymi.



+20°C

+30°C

1 litr
objętość

• • • • • PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ • • • • •

Nazwa produktu: Silver Mix®. **Zakres zastosowania:** uprawa roślin. Silver Mix® jest stosowany jako płynny nawóz z mikroelementami stosowany w uprawie. Stosuje się go w różnych uprawach polowych oraz szklarniowych. Silver Mix® stosuje się w celu uzupełnienia niedoboru niezbędnych pierwiastków śladowych w całym okresie wegetacyjnym. Polecamy jest również do zaprzeczania nasion i bulw roślin uprawianych. **Ograniczenia dotyczące transportu, używania i przechowywania:** wymagania dotyczące zagrożeń: Należy przestrzegać ogólnych wymagań dotyczących higieny i bezpieczeństwa podczas transportu, przeładunku i przechowywania produktu. Odzież ochronną musi być dokładnie czyszczona po użyciu. **Przechowywanie:** chronić przed dziećmi. W miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z zwinnością, napojami lub paszą. W temperaturze +2°C +30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, oznakowanym, szczelnie zamkniętym, w chłodnym, suchym i zamkniętym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem. **Transport:** produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie podczas transportu. Podczas transportu nawóz musi być przechowywany w pojemnikach w temperaturze od +2°C do +30°C. **Zalecenia dotyczące stosowania:** dla producentów roślin. **Zalecane stężenie:** interwencyjne – 0,5%; profilaktycznie – 0,3%.

Uprawa	Normy dawkowania	Dopuszczalne roztworu roboczego	Sposób aplikacji i ilość zabiegów w sezonie
Zboża (ozime i jare)	0.25 Lt/L 10 Lt/L	50-300 Lha	Zaprzeczanie nasion 1 raz jesienią w fazie 4-6 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i 10-14 dni później
Rzepak ozimy	0.25 Lt/L 10 Lt/L	100-300 Lha	Zaprzeczanie nasion 1 raz jesienią w fazie 2-4 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i 10-14 dni później
Rośliny zielonkowe (groch, fasola, soja)	0.25 Lt/L 10 Lt/L	200-300 Lha	Zaprzeczanie nasion Po wywierzchnieniu nasion i kłosek, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Ziemniaki	0.5 Lt/L 10 Lt/L	200-300 Lha	Zaprzeczanie bulw Po wywierzchnieniu pokroju krzaka, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Burak cukrowy	0.25 Lt/L 10 Lt/L	200-300 Lha	Zaprzeczanie nasion Pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16), kolejne co 10-14 dni
Słonecznik	0.25 Lt/L 10 Lt/L	200-300 Lha	Zaprzeczanie nasion 1 raz jesienią w fazie 4-6 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Kukurudza	0.25 Lt/L 10 Lt/L	200-300 Lha	Pierwszy zabieg w fazie 6 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Warzywa polowe - buraki cukrowe, cebula, marchew, pietruszka, kapusta, brokuł, kalafior, kapusta, pomidor, ogórek, papryka	0.025 Lt/L 10 Lt/L	300-500 Lha	2 tygodnie po wysadzeniu nasion lub w fazie 4-6 liści dla warzyw z siewu, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Winnice	1.0-2.0 Lt/L	300-500 Lha	Pierwszy zabieg po wywierzchnieniu kwiatoznoszących 2. koniec kwitnienia; 3. tworzenie owoców - faza tworzenia jagód wielkość gron
Orzechy owocowe - orzeszki, mała, kaszka, grusze, porzeczki	1.0-2.5 Lt/L	500-600 Lha	Pierwszy zabieg po wywierzchnieniu jagód kwiatowych, koniec kwitnienia; 3-5 zabiegów w trakcie wzrostu owoców oraz 2-3 zabiegów po zbiorze owoców. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 10
Drzewa owocowe	0.5-1.5 Lt/L	500-800 Lha	Pierwszy zabieg po wywierzchnieniu jagód kwiatowych, koniec kwitnienia; 3-5 zabiegów w trakcie wzrostu owoców oraz 2-3 zabiegów po zbiorze owoców. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 10
Łąki i pastwiska	0.5-1.0 Lt/L	200-300 Lha	Po ruszeniu wegetacji, następnego zabiegi 7-10 dni po każdym pokosie, wywzrostek byłby
Rośliny ozdobne-rabazowe, krzewy, byliny	20-50 ml 10 Lt/L wody	200-300 Lha	Pierwszy zabieg w okresie intensywnego wzrostu, kolejne co 10-14 dni

Uwaga! Nie mieszać z preparatami mikrobiologicznymi (bakteriami, zarodnikami, grzybami), z preparatami zawierającymi siarkę, jod, siarczan miedzi, siarczan żelaza, tiolochlorek miedzi i azotan wapnia.

W celu podniesienia efektywności działania naszych produktów zalecamy stosowanie preparatu nieorganicznego, organosolinkowego surfaktantu **FolioStark®**, który nawilża, zwiększa przyczepność i obojętnia napiecie powierzchniowe liści. W przypadku ewentualnych pytań - zaleca się kontakt z naszym konsultantem. WhatsApp / Tel.: +48 533 216 471, e-mail: wik@bosagra.com.

Zagrożenia dla środowiska: przedostaniu się do wodociągów i kanalizacji pozostałości nawozu, roztworu roboczego, opakowania i wody z mycia sprzętu. **Jeśli opakowanie zostało uszkodzone:** rośliny nawleż należy przysypać materiałem absorbującym (piaskiem lub trocinami), zebrać do pojemników i przekazać firmie zajmującej się gospodarką odpadami. **Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia:** w przypadku wystąpienia objawów zanieganych poradzić lekarza. **W przypadku połknięcia:** wypłukać usta ciepłą wodą i wypić kieliszek wody. Wymuśk, wymuśk, następnie wypić węgla aktywowanego (4-5 g węgla aktywowanego na szklankę wody) i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. **W przypadku kontaktu ze skórą:** zanieczyszczone skóre przemyć wodą z mydłem. **W przypadku dostania się do oczu:** spłukać bieżącą wodą. **W przypadku dostania się do dróg oddechowych:** wyjść na świeże powietrze, zdjąć odzież ochronną i zasięgnąć porady lekarza. **Telefon ratunkowy:** 112

UFI: 8300-0003-M00R-664T

519006441532477

Składniki: EDTA disodowa sól manganu hydrat¹
(nr CAS: 15375-84-5), chelat cynku EDTA¹
(nr CAS: 14025-21-9)

CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny