

PF 1(C)(I)(B)(II)

WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Silver Phos®

PK 3,7-5,8 nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe w roztworze

Skład % (m/m)

3,7% – całkowitego pięciotlenku **fosforu (P_2O_5)**, w tym: 3,7% (m/m) – rozpuszczalnego w wodzie pięciotlenku fosforu (P_2O_5)

5,8% – rozpuszczalnego w wodzie tlenku **potasu (K_2O)**

0,130% – **molibdenu (Mo)** w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie

+ srebro (Ag) - 320 mg/kg

Zawiera: **Selen (Se) – 0,043 mg/l**

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki.
pH roztworu: 8.1.

Składniki: EDTA disodowa sól manganu hydrat¹ (nr CAS: 15375-84-5),
chelat cynku EDTA¹ (nr CAS: 14025-21-9)
¹ CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Producent: Bosagra Sp. z o.o.,
ul. Jaama 4, Paldiski, Hrabstwo Harju, 76806, Estonia.
Zakres temperatury przechowywania: +2°C do +30°C
Okres gwarancyjny przechowywania: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji: 01.2025 Numer partii PLN-2025/01



wyprodukowany
w nanotechnologii
SCS-tech®



H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do przepisami krajowymi.



5 litr
objętość

• • • PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ! • • •

Nazwa produktu: Silver Phos®. **Zakres zastosowania:** uprawa roślin. Silver Phos® jest stosowany jako płynny nawóz z makro i mikro elementami stosowany w uprawie. Stosuje się go w różnych uprawach polowych oraz szklarniowych. Silver Phos® stosuje się do uzupełnienia niedoboru niezbędnych pierwiastków śladowych w całym okresie wegetacyjnym. Polecany jest również do zaprawiania nasion i bulw roślin uprawnych. **Ograniczenia dotyczące transportu, używania i przechowywania:** wymagania dotyczące zagrożeń: Należy przestrzegać ogólnych wymagań dotyczących higieny i bezpieczeństwa podczas transportu, przeładunku i przechowywania produktu. Odzież ochronna musi być dokładnie czyszczona po użyciu. **Przechowywanie:** chronić przed dziećmi. W miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. W temperaturze +2°C +30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów. Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, oznakowanym, szczelnie zamkniętym, w chłodnym, suchym i zamkniętym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem.

Zalecenia dotyczące stosowania: dla producentów rolnych. **Transport:** produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie podczas transportu! Podczas transportu nawóz musi być przechowywany w pojemnikach w temperaturze od +2°C do +30°C. **Zagrożenia dla środowiska:** zapobiegając przedostaniu się do wódociągów i kanalizacji pozostałości nawozu, roztworu roboczego, opakowania i wody z mycia sprzętu. **Jeśli opakowanie zostało uszkodzone:** rozlany nawóz należy przysypać materiałem absorbującym (piaskiem lub trocinami), zebrać do pojemników i przekazać firmie zajmującej się gospodarką odpadami. **Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia:** w przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. **W przypadku połknięcia:** wypłukać usta ciepłą wodą i wypić kilka szklanek wody. Wywołać wymioty, następnie wypić węgiel aktywowany (4-5 g węgla aktywowanego na szklankę wody) i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. **W przypadku kontaktu ze skórą:** zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. **W przypadku dostania się do oczu:** spłukać bieżącą wodą. **W przypadku dostania się do dróg oddechowych:** wyjść na świeże powietrze, zdjąć odzież ochronną i zasięgnąć porady lekarza. **Telefon ratunkowy:** 112.

Uprawa	Normy dawkowania	Dozowanie roztworu roboczego	Sposób aplikacji i terminy stosowania
Zboża (ozime i jare)	0,25 L/t	6-10 L/t	Zaprawianie ziarna
	0,2-0,3 L/ha	50-300 L/ha	1 raz jesienią w fazie 2-4 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i 10-14 dni później
Rzepak ozimy	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,3-0,5 L/ha	100-300 L/ha	1 raz jesienią w fazie 2-4 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji i po wytworzeniu paków kwiatowych później
Rośliny strączkowe (groch, fasola, soja)	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,3-0,5 L/ha	100-300 L/ha	Jeden zabieg przeprowadza się w fazie pączkowania, drugi - w fazie kwitnienia. Przetwarzania - 2
Ziemniaki	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie bulw
	0,5-1,0 L/ha	200-300 L/ha	Po wytworzeniu pokroju krzaka, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Buraki cukrowe	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,5-1,0 L/ha	200-300 L/ha	Pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16), kolejne co 10-14 dni
Słonecznik	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,3-0,5 L/ha	200-300 L/ha	Po wytworzeniu 4 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Kukurydza	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,5 L/ha	200-300 L/ha	Pierwszy zabieg w fazie 6 liści, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Warzywa polowe	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,3-0,5 L/ha	300-500 L/ha	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady lub fazie 4-6 liści dla warzyw z siewu, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Warzywa pod osłonami	0,25 L/t	10 L/t	Zaprawianie nasion
	0,3-0,5 L/ha	300-500 L/ha	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady lub fazie 4-6 liści dla warzyw z siewu, kolejne zabiegi co 10-14 dni
Winnice	0,3-0,5 L/ha	300-500 L/ha	Pierwszy zabieg po wytworzeniu kwiatostanów; 2.Koniec kwitnienia; 3.Tworzenie owoców - faza tworzenia jagód wielkości grochu
Krzewy owocowe - borówka, malina, truskawka, agrest, porzeczka	0,3-0,5 L/ha	500-600 L/ha	Pierwszy zabieg po ruszeniu wegetacji, kolejne 2 zabiegi w okresie kwitnienia, w trakcie wzrostu owoców i 1-2 zabiegi po zbiorze owoców, stężenie 0,3%
Drzewa owocowe	0,3-0,5 L/ha	500-800 L/ha	Pierwszy zabieg po wytworzeniu paków kwiatowych, kolejne zabiegi co 10-14 dni w trakcie wzrostu owoców i 1-2 zabiegi po zbiorze owoców, stężenie 0,3%
Rośliny ozdobne-rabatowe, byliny, krzewy	30-50 ml	10 L wody	Pierwszy zabieg w okresie intensywnego wzrostu, kolejne co 10-14 dni

Uwaga! Nie mieszać z preparatami mikrobiologicznymi (bakteriami, zarodnikami, grzybami), z preparatami zawierającymi siarkę, jod, siarczan miedzi, siarczan żelaza, tlenochlorek miedzi i azotan wapnia.

W celu podniesienia efektywności działania naszych produktów zalecamy stosowanie preparatu niejonowego, organosilikonowego surfaktantu **FolioStick®** który nawilża, zwiększa przyczepność i obniża napięcie powierzchniowe liści.

W przypadku ewentualnych pytań - zaleca się kontakt z naszym konsultantem.

WhatsApp / Tel.: +48 533 216 471

UFI: V600-70DG-X007-5HQV



5 900644 532521